



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



كاربيمازول

Carbimazole

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

يُستخدم هذا العقار لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا

العقار؟

- إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاقير مثل هذا العقار أو أي عقاقير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.
- قد يتفاعل هذا العقار مع العقاقير الأخرى أو المشاكل الصحية الأخرى.
- أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاقير التي تتناولها التي صُرِفَت بوصفة طبية

أو دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية
كالأعشاب والفيتامينات ومشاكلك الصحية.
تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو
إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول

هذا الدواء؟

- ♦ يراعى إبلاغ أطباء الأسنان والجراحين والأطباء الآخرين بأنك تستعمل هذا العقار.
- ♦ احرص على ألا ينفذ هذا الدواء من عندك.
- ♦ تجنب قيادة السيارة أو القيام بمهام أو أنشطة أخرى تتطلب منك اليقظة حتى تلاحظ مدى تأثير هذا العقار عليك.
- ♦ عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.
- ♦ ستزداد مخاطر الإصابة بالعدوى لديك. تجنب

الأماكن المزدحمة والأشخاص الذين يعانون من
عدوى مثل نزلات البرد، أو الأنفلونزا.

♦ قد تصاب بنزيف بسهولة أكثر. كن حريصاً،

وتجنب الإصابة. ينبغي استعمال فرشاة أسنان
ناعمة وماكينة حلاقة كهربائية.

♦ يجب استعماله بحذر مع الأطفال. استشر
الطبيب.

♦ قد يتسبب هذا العقار في إلحاق ضرر بالجنين إذا
تناولته وأنتِ حامل. إذا أصبحتِ حاملاً أثناء تناول
هذا العقار، اتصلي بطبيبك فوراً.

♦ يجب إخطار طبيبك، إذا كنتِ حاملاً أو تخططين
للحمل أو الإرضاع. لا بد من التشاور بخصوص
المزايا والمخاطر المرتبطة باستعمال هذا العقار
أثناء حملك وإرضاعك.

قد يضطر الطبيب لصرف جرعات قليلة من هذا الدواء
أثناء الحمل إذا كانت الحالة الصحية تستدعي ذلك وقد

يطلب منك إيقافه قبل الولادة بفترة 3-4 أسابيع.

مالأسباب الداعية للاتصال بأخصائي الرعاية

الصحية على الفور؟

- رضوض أو نزيف غير عادي.
- آلام أو تورم المفاصل.
- صداع شديد.
- دوار شديد أو إغماء.
- عدم القدرة على التبول أو تغييرات في كمية البول.
- إحساس غير معتاد بالحرقة أو بالتنميل أو الوخز.
- الشعور بالإرهاق أو الضعف الشديد.
- سعال مصحوب بدم.
- براز فاتح اللون.
- علامات وجود مشاكل الكبد مثل بول داكن

اللون أو الشعور بالإرهاق أو عدم الشعور بالجوع
أو اضطراب في المعدة أو ألم في المعدة أو براز
فاتح اللون أو قيء أو اصفرار لون الجلد أو
العيون.

■ أعراض العدوى: تشمل هذه الأعراض حدوث
حمى حيث تصل درجة الحرارة إلى 100.4 درجة
فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى أو حالات
قشعريرة أو التهاب شديد في الحلق أو ألم
بالأذن أو الجيوب الأنفية أو السعال أو زيادة في
البلغم أو تغير لون البلغم أو ألم عند التبول أو
وجود قروح بالفم أو جرح لا يندمل أو وجود حكة
أو ألم بالشرج.

ما هي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا العقار؟

- ❖ الصداع، الدوار.
- ❖ اضطراب المعدة أو قيء، ألم في البطن.
- ❖ ألم في المفاصل، آلام في العضلات.

- ❖ الشعور بالإرهاق أو الضعف.
- ❖ تساقط الشعر.
- ❖ تغير في القدرة على التذوق.
- ❖ يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى وكالة الصحة المحلية لديك.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

- ◆ تناول هذا العقار حسب أوامر طبيبك. اقرأ تعليمات الجرعة على الملصق واتبعها بدقة.
- ◆ يُستعمل هذا العقار حسب التوجيهات، حتى إذا شعرت بتحسُّن.
- ◆ تناول العقار مع الطعام أو بدونهِ. تناول العقار دائماً مع الطعام أو على معدة فارغة.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

- ✓ تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك.
- ✓ إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتخط الجرعة الفائتة وارجع لمواعيدك العادية.

✓ يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

✓ يجب عدم تغيير الجرعة أو إيقاف هذا العقار.
يرجى استشارة الطبيب.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

- يُخزن في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف.
يحظر التخزين في الحمام.
- احفظ جميع العقاقير بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

إرشادات عامة:

- إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءًا، اتصل بطبيبك.
- يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

- إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزاً لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

مركز السمثة والغدة الصماء

HEM2.17.000597

