



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



العناية بالقسطرة الوريدية


Central Line Care

ماهي القسطرة الوريدية؟



أنبوب طويل ومرن يوضع في وريد كبير طرفه الأول تحت الجلد وطرفه الآخر قريب من القلب.

بالنسبة للجزء الخارجي، قد تنقسم القسطرة إلى تجويف واحد أو تجويفين أو ٣ تجاويف. يحتوي كل تجويف على مشبك وموصل بدون إبر في نهايته.



القسطرات الوريدية المركزية غالباً ما تتسبب في عدوى بكتيرية والتهابات تدخل إلى الدم، إذا لم يتم العناية بها والمحافظة عليها من قبل مقدم الرعاية الطبية بالإضافة إلى المريض والمهتمين به.

تستلزم **العدوى الناتجة عن تجرثم الدم بالبكتيريا** إلى إزالة القسطرة وعلاج المريض بالمضادات الحيوية والتي قد يكون فيها خطورة كبيرة على صحتك.

للقائمين على رعاية المريض من الأهل أو الأقارب دور كبير خلال وجوده في المستشفى في **الوقاية من حدوث عدوى القسطرة المركزية** بإتباع الخطوات البسيطة التالية:



1) تأكد من حصولك على التثقيف المناسب للعناية بالقسطرة من قبل أخصائي مكافحة العدوى.



٢) تأكد من غسل يديك جيداً بالماء والصابون أو تعقيمها بمعقم اليدين قبل وبعد أي لمسك للمريض أو محيطه وقبل وبعد لبس القفازات.



٣) تأكد من قراءة الملصقات الخاصة بمكافحة العدوى ودرجة الحماية المطلوبة للتعامل مع المريض.



٤) تأكد من أن مقدم الرعاية من الطاقم الطبي يتبع هذه التدابير الوقائية والموضوعة على باب غرفة المريض

من الخارج وإذا لوحظ عدم إتباعها الرجاء الإبلاغ فوراً للشخص المسؤول في القسم.



٥) التأكد من أن مقدم العناية يقوم بتعقيم مدخل القسطرة بالكحول قبل وبعد توصيل أي شيء بها مثل التغذية أو الأدوية ولمدة لا تقل عن **١٥ ثانية**.

٦) إذا كان المريض منوم لمدة طويلة الرجاء



التأكد من أنه تم تغيير الضماد
للقسطرة كل سبعة أيام أو عند تعرض
الضماد للإتساخ أو الرطوبة أو الارتخاء.



٧) التأكد من استحمام المريض يوميا
بوسائل مضاد للبكتيريا.



٨) التأكد من عدم العبث بالقسطرة أو
تحريكها من مكانها وإبلاغ مقدم
العناية (ممرض أو طبيب) في حال حدث
ذلك.



عند عدم اتباع أي من هذه الخطوات الرجاء عدم
التردد في الإبلاغ عن ذلك للمسؤولين أو عبر
الاتصال على الرقم ٩٣٩٣




في حال ملاحظة التالي الرجاء
الإسراع في إبلاغ مقدم العناية
من ممرض أو طبيب:

- احمرار أو تورم في مدخل القسطرة.
- خروج سائل متبدل اللون يخرج من مدخل الجهاز.
- إذا كان هناك ألم حول مكان دخول الجهاز.
- إذا شعر المريض بتعرق أو رعشة/ارتفاع في الحرارة.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم مكافحة العدوى



HEM2.19.000837

