





مدينة الملك فهد الطبية  
King Fahad Medical City



## القسطرة الوريدية الطرفية المركزية

PICC Line

## ماهي القسطرة الطرفية المركزية؟



هي أنبوبة بلاستيكية مرنة صغيرة الحجم يتم إدخالها في أحد الأوردة بالذراع حتى تصل إلى أوردة الصدر المركزية، يثبت طرفها الخارجي بلاصق طبي ويمكن أن يظل من عدة أسابيع إلى أشهر إذا تمت المحافظة عليها.

## ماهي دواعي الاستخدام؟

## تستخدم القسطرة الطرفية المركزية في

### حالات:

- إعطاء الأدوية والمحاليل والمضادات الحيوية الوريدية التي تحتاج لمدة طويلة والعلاج الكيماوي.
- إعطاء التغذية الوريدية.
- سحب عينات الدم اللازمة.
- التقليل من عدد مرات وخز الإبر في الوريد.

## كيف تعتني بالقسطرة؟



المحافظة على الضماد المحيط جاف ونظيف



القيام بالإستحمام السريع بدلاً من استخدام البانيو، ويجب تجنب السباحة



عند الإستحمام يفضل تغطية القسطرة ببلاستيك شفاف لتجنب تعريضها المباشر للماء



تجنب علاج الأسنان الجراحي خلال وجود القسطرة



عدم قياس الضغط في الذراع التي تحتوي على القسطرة ويمكن قياسه في الذراع الأخرى



عدم القيام بالمجهودات الشاقة أو حمل الأشياء الثقيلة التي تزيد عن 5 كجم

## كيف يتم تغيير الضماد على القسطرة؟

- يجب مراقبة الضماد على القسطرة الوريدية الطرفية بشكل يومي.
- تذكر دائماً غسل اليدين قبل التعامل مع القسطرة.
- لا تستخدم المقص أبداً في إزالة اللاصق أو الضماد حول القسطرة.
- يجب تغيير الضماد على الأقل مرة واحدة أسبوعياً.
- إذا كان الضماد رطباً أو غير نظيف أو غير ثابت أو واسع فيجب تغيير الضماد مباشرة للوقاية من العدوى.

## كيف تتجنب انسداد القسطرة؟

- غسل اليدين أولاً.
- تنظيف الغطاء المطاطي من القسطرة بالمطهر الطبي (الكحول).
- دفع ١٠ مل من المحلول الملحي قبل وبعد كل استخدام، أو مرة أسبوعياً في حالة عدم الاستخدام.
- لا تدفع المحلول الملحي بقوة إذا كان هناك مقاومة.



### ماهي العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب؟

- انتفاخ، احمرار أو حرارة في الذراع أو في الرقبة.
- ألم في منطقة القسطرة في الذراع.
- ارتفاع في درجة الحرارة.

# لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

إدارة تشغيل الخدمات الإشعاعية

قسم الأشعة التداخلية

HEM1.18.000568

