




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City




الدرن

Tuberculosis

الدرن (السل)

هو مرض معدٍ سببه بكتيريا (المایکوبکتیریوم)، و تصيب الرئتين بشكل رئيسي وقد تصيب أجزاء أخرى من الجسم (درن خارج الرئة).



كيف تنتقل العدوى؟

تنقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب بعد الكحة أو العطاس أو الاحتكاك المباشر.

بعد انتقال العدوى يصبح الشخص إما:

مصاب ببكتيريا (نشطة)
(الدرن النشط)
تظهر عليه الاعراض
معدية للأشخاص الآخرين


حاملاً لبكتيريا (خاملة)
(الدرن الكامن)
لا تظهر عليه الاعراض
غير معدية
قد تنشط البكتيريا
مستقبلاً.

أعراض الإصابة بالدربن:




كحة مستمرة لثلاثة أسابيع أو أكثر، أو مصحوبة بدم.

ألم في الصدر عند الكحة أو التنفس.



نزول في الوزن، فقدان للشهية.

تعب وخمول.



حمى.

العرق أثناء الليل.



الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالدرن:



يمكن لأي شخص أن يتعرض للإصابة، ولكن العوامل التالية تزيد فرصة الإصابة مثل:

-**نقص المناعة**، وقد تكون بسبب:


- الإصابة بمرض السكري.
- فيروس نقص المناعة أو الإيدز.
- مرض السرطان و تعرضهم للعلاج الكيميائي.
- تناول بعض الأدوية التي تسبب تثبيط للمناعة.
- التغذية السيئة.
- العمر (الأطفال أو كبار السن).

-**السفر أو الانتقال للعيش في مناطق ترتفع فيها نسبة الإصابة بمرضى الدرن.**

-**العمل أو الاختلاط المباشر مع المصابين بالدرن.**

التشخيص

هناك عدة طرق للتشخيص عن طريق فحص:



- **الجلد:** حيث تحقن مادة سائلة (Tuberculin) تحت الجلد في منطقة أسفل الذراع.

وبعد يومين إلى ثلاثة أيام يتم فحص مكان الحقن للكشف عن ظهور انتفاخ أو تورم صلب أو أحمرار في المنطقة، حيث أن ذلك يعني احتمال إصابتك بالدربن.



- **الدم:** وذلك لقياس ردة فعل الجسم مع البكتيريا المسببة للدربن.

- **البلغم:** عن طريق الفحص المخبري للبكتيريا.

- **الجسم:** (الفحص السريري) للبحث عن أعراض أو علامات

- **الصدر:** بالأشعة السينية X-ray.

- **تارikh العائلة المرضي:** حدوث إصابات سابقة بالدربن.


العلاج



عن طريق الأدوية وقد تستغرق لمدة تتراوح ما بين ٩ إلى ٢٤ شهر لمرضى الدرن (الحساس للأدوية)، بينما مرضى الدرن (المقاوم للأدوية) قد تزداد فترة العلاج إلى سنتين تقريباً.

ننصح المصاب بالدرن بالحد من انتشار العدوى وذلك عن طريق:

- البقاء في مكان معزول خاصّة في الأسابيع الأولى من الإصابة بالعدوى.
- ارتداء الكمامات في حال التواجد من الآخرين.
- تهوية المكان.
- الالتزام بالدواء الموصوف.





دائماً احرص على الالتزام بفترة العلاج
المحددة ولا تتوقف إلا بإذن من الطبيب
المعالج، وإهمالك للعلاج قد يؤدي إلى
مضاعفات انتشاره لأجزاء أخرى من الجسم
مثل الدماغ، القلب، العظام، الكبد أو الكلى.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم التوعية الصحية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh



KfmcRiyadh



8001277000

