

## تعليمات تحضير الأمعاء الغليظة (القولون) لمنظار القولون

بروتكول (ب): حبة واحدة من دواء بيسكوديل (Bisacodyl 5mg)

32 كيس من دواء الموفيكول (Movicol®)

### موعد منظار القولون:

Put patient tag	اليوم
	التاريخ: / / ٢٠ الموافق / / ١٤
	الوقت
في حال الاستفسار بخصوص الموعد أو أي إجراء يتعلق بالمنظير يسعدنا التواصل معكم على هذا الرقم: ٠١٢ ٨٨٩٩٩٩ - تحويلة: ١١٢ ٣٩	المكان: وحدة المناظير - المستشفى الرئيسي - الدور الأرضي - مدينة الملك فهد الطبية

### ٧ أيام قبل المنظار:

- إيقاف الحبوب المحتوية على الحديد أو الفيتامينات والكالسيوم أو المسكنات التي تحتوي على المورفين.
- لا توقف الأدوية المسيلة للدم إلا إذا طلب منك الطبيب المعالج إيقاف هذه الأدوية.
- الرجاء عمل مسحة كورونا قبل المنظار بـ ٤٨ ساعة.


### في اليوم الذي يسبق المنظار:

**تناول وجبة إفطار** خفيفة (مثل البيض والزبدة والمربي والخبز الأبيض) وابتعد عن الحليب واللبن والجبن والزبادي والفواكه والخضروات والكورن فليكس وذلك قبل الساعة العاشرة صباحاً وعدم الأكل بعد ذلك خلال هذا اليوم حتى الإنتهاء من عملية المنظار صباح اليوم التالي. يمكنك في هذا اليوم فقط استهلاك السوائل الشفافة (الماء أو عصير التفاح المعلب) إلى صباح اليوم التالي قبل وقت المنظار بـ ٤ ساعات.


انظر للخلف لإكمال التعليمات



## تعليمات تحضير المحلول:



## تعليمات شرب المحلول:



## تعليمات ليوم المنظار واليوم الذي يسبقه:

١. إيقاف حبوب أدوية السكر بجميع أنواعها في صباح يوم المنظار واليوم الذي يسبقه وبالإمكان تناولها مباشرة بعد الانتهاء من عملية المنظار.
٢. إذا كنت تستخدم حقن الأنسولين فيجب الاكتفاء بنصف الجرعة وتؤخذ في نفس أوقاتها السابقة في يوم المنظار واليوم الذي يسبقه.
٣. يجب تناول أدوية أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وأدوية الغدة الدرقية، و التشنجات أو الأعصاب إذا كنت مصابا بأحد هذه الأمراض في صباح يوم المنظار قبل الساعة ٦ صباحا مع كوب ماء.
٤. إحضار قائمة الأدوية التي تستخدمها والأدوية التي تسبب لك الحساسية.
٥. أحضر مرافق لك ليوصلك للمنزل بعد الفحص لأنه سيتم تخديرك أثناء الفحص ولن يكون في استطاعتك قيادة السيارة لبقية اليوم.

