



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



إيزوترتوينين

Isotretinoin

لماذا يُستخدم الإيزوترتونين؟

يستخدم الدواء بشكل رئيسي لعلاج حب الشباب. ولكن قد يتم وصفه لأسباب أخرى يرجى استشارة الطبيب.



ماهي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها

قبل استخدام الدواء؟

- أخبر طبيبك المعالج إذا كان لديك أي حساسية.
- إذا كنتِ تخططين للحمل أو تتوقعين حدوث حمل في فترة العلاج أو بعده بشهر.
- إذا كنتِ ترضعين طفلك الرضاعة الطبيعية.

ماهي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند استخدام

الدواء؟

- أخبر مقدم الرعاية الصحية أنك تتناول هذا الدواء.
- توخ الحذر عند القيادة ليلاً أو القيام بمهام أخرى في إضاءة منخفضة.
- لا تتبرع بالدم أثناء استعمال هذا الدواء حتى بعد شهر من التوقف عن إستعماله.
- إحرص على إجراء الفحوصات الدموية بشكل دوري حسب تعليمات الطبيب.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة دون حماية لأنه قد تتعرض لحروق شمسية بسهولة أكبر.
- استعمل كريم يقيك من أشعة الشمس وارتد ملابس واقية ونظارة شمسية تقيك من الشمس.
- تجنب وسائل العلاج التجميلية للبشرة، مثل: إزالة الشعر بالشمع أو العلاج بالليزر أثناء تناول الدواء.

ما الآثار الجانبية الأخرى لهذا الدواء؟



- جفاف الفم والشفاه.
- جفاف العين.
- جفاف الجلد.
- تهيج الأنف.
- تغير في قدرة احتمال العدسات اللاصقة.
- قد يسبب هذا الدواء ارتفاعاً في مستويات الكولسترول وثلاثي الجليسريد.
- قد يتسبب في إلحاق الضرر بالجنين.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

- تجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الدواء المعتاد.
- يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

تحذير



- يحظر تناوله إذا كنتِ حاملاً أو من المحتمل أن تكوني حاملاً.
- يجب إجراء اختبار حمل للتأكد من أنك لستِ حاملاً قبل بدء تناول هذا الدواء.
- ينبغي استعمال وسيلتين موثوق فيهما لمنع الحمل قبل بدء العلاج بشهر وأثناء العلاج ولمدة شهر واحد على الأقل بعد التوقف عن تناوله.
- إذا حملتِ أثناء تناول هذا الدواء أو خلال الشهر الأول بعد إيقاف تناوله، اتصلي بالطبيب فوراً.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلية الخارجية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM1.20.00001125

