



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



داي ميثيل فيوماريت

Dimethyl fumarate

اسم الدواء العلمي:

داي ميثيل فيوماريت



لماذا يستخدم هذا العلاج؟

**يستخدم لعلاج المرضى البالغين اللذين يعانون من
مرض التصلب المتعدد ذو الانتكاسات المختلفة.**

ماهي الآثار الجانبية التي قد يسببها هذا الدواء؟
قد يسبب الدواء آثار جانبية خطيرة بما في ذلك:

- رد الفعل التحسسي (مثل تورم الوجه أو الشفتين أو الفم أو اللسان أو صعوبة التنفس)
- عدوى فيروسية نادرة في الدماغ قد تؤدي للوفاة أو العجز الشديد.



- انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء
لذا؛ يجب على طبيبك إجراء فحص
للدّم قبل البدء في العلاج وأثناء العلاج.
- مشاكل في الكبد

**أخبر طبيبك مباشرة إذا كنت تعاني من أي من
هذه الأعراض:**

التعب الشديد

فقدان الشهية

ألم في الجانب الأيمن من المعدة

تغير لون البول إلى اللون الداكن أو بني (لون الشاي)

اصفرار البشرة أو الجزء الأبيض من العين

**الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للدواء قد تشمل
والتي قد تنخفض بمرور الوقت:**

- الاحمرار.
- القيء.
- الكحة.
- الإسهال.
- الطفح
- ألم المعدة.
- الجلدي.
- الغثيان.
- عسر الهضم.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية، اتصل بطبيبك أو
استشر الصيدلي لمعرفة كافة المعلومات المتعلقة
بالدواء.

ماهي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

- خذ الدواء حسب التعليمات الموصى بها من قبل الطبيب.
- ابدأ بالجرعة الموصى بها وهي ١٢٠ ملغم وخذها عن طريق الفم مرتين يومياً لمدة أسبوع.
- ارفع الجرعة إلى 240 ملغم وخذها عن طريق الفم مرتين يومياً.
- يمكن تناول الدواء مع أو بدون الطعام (يفضل مع الطعام).
- تناول الدواء بابتلاعه كما هو، لا تقم بسحق أو مضغ أو رش محتويات الكبسولة على الطعام

- إذا تناولت جرعة زائدة من الدواء، اتصل بطبيبك أو اذهب إلى أقرب مستشفى.
- إذا نسيت أخذ الجرعة، فلا تأخذ جرعة مضاعفة.

ماهي الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

أخبر طبيبك إذا كنت تعاني في السابق أو حالياً من إحدى الحالات التالية:

- ✓ مرض الكلى الحاد.
- ✓ مرض الكبد الحاد.
- ✓ مرض في المعدة او الأمعاء.
- ✓ عدوى خطيرة (مثل الالتهاب الرئوي).
- ✓ انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء.
- ✓ حساسية من داي ميثايل فيوماريت أو أي من مكوناته

- ✓ استخدام الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة
والفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية
العشبية التي تتناولها أو تخطط لها.
- ✓ إذا كنت حاملا أو تخططين للحمل أو ترضعين
رضاعه طبيعية.

كيف يتم حفظ الدواء؟

- احتفظ به في عبوته الأصلية مغلقة بإحكام بعيدا
عن متناول الأطفال.
- احتفظ به في درجة حرارة الغرفة، بعيدا عن الضوء
المباشر أو الحرارة أو الرطوبة.

لا تتردد في سؤال الصيدلي إذا احتجت لمزيد من
المعلومات

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدلة السريرية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM1.20.000993

