



مدينة الملك فهد الطبية  
King Fahad Medical City



**دواء بريجابالين**

**Pregabalin**

## ما هو بريجابالين؟

ينتسب **بريجابالين** المشهور باسمه التجاري ليريكال (Lyrica) إلى مجموعة الأدوية المستعملة في العلاج الصرع وآلام الأعصاب واضطراب القلق العام في البالغين.

## دواعي الاستعمال:

### • آلام الأعصاب الطرفية والمركزية:

يستخدم لعلاج الألم طويل الأمد الناجم عن تلف الأعصاب. والذي قد تسبب العديد من أمراض اعتلال الأعصاب المحيطية، مثل مرض السكري أو القوباء المنطقية. يمكن وصف الألم بأنه حرق، إطلاق نار، طعن، حدة، تشنج، ألم، وخز، ودبابيس.

قد يكون ألم الاعتلال العصبي المحيطي والمركزي مرتبطاً أيضاً بتغيرات الحالة المزاجية والنوم وقد يؤثر على الوظائف الجسدية والاجتماعية والجودة العامة.

- **الصرع:**

يستعمل لعلاج شكل معين من الصرع (نوبات جزئية مع أو بدون ثانوي التعميم) عند البالغين.

⚠ سيصف لك طبيبك بريدجبالين لتساعدك في علاج الصرع في حالة لم تستجب للعلاج الحالي.

- **اضطراب القلق المعمم:**

يستخدم في علاج أعراض اضطراب القلق العام، وهو القلق المفرط والقلق لفترات طويلة يصعب السيطرة عليها.

**ما الذي يجب أن أخبر به طبيبي قبل أن  
اتناول هذا العقار؟**



- إذا كنت مصابًا بحساسية تجاه هذا الدواء، أو أي مكون منه، أو أي دواء آخر، أو أطعمة، أو مواد أخرى .

- إذا كنت تعاني من مرض في الكلى.
- إذا كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية، **أوقفي** الرضاعة الطبيعية عند تناول هذا العقار.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن جميع الأدوية التي تتناولها (الأدوية الموصوفة، الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات).
- ⚠ تجنب بدء أو إيقاف أو تغيير جرعة أي دواء دون استشارة الطبيب أولاً.

## تعليمات تناول الدواء:



| أقراص                                                                     | طريقة التناول  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| يتم تناول الدواء من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم                          | عدد الجرعات    |
| الجرعة الموصى بها من ١٥٠ إلى ٦٠٠ ملليغرام يوميًا.                         | الجرعة         |
| أثبتت التجارب السريرية أن الألم يخف، أو عدد النوبات يقل أيضًا خلال أسبوع. | بداية الفعالية |
| ٨ إلى ١٢ ساعة.                                                            | مدة الفعالية   |

## نسيان تناول عقار بريجابالين:

- فيمكن تناوله أثناء التذكر. إذا حان وقت تناول الدواء التالي تقريبًا، فتجاهل الدواء المنسي وتناول الدواء التالي كالمعتاد بدلاً من تناوله مرتين.

## وقف استخدام عقار بريجابالين

- لا تتوقف عن تناول الدواء بدون استشارة الطبيب. يوصى بعدم التوقف عن العلاج بشكل مفاجئ، حيث سيؤدي ذلك إلى ظهور الأعراض مرة أخرى. توقف تدريجيًا عن العلاج الدوائي خلال أسبوع واحد على الأقل.

## إفراط تناول عقار بريجابالين

- إذا تناولت جرعة زائدة عن طريق الخطأ، فلن تسبب مشاكل خاصة، ولكن إذا واجهت أعراضًا معينة أو تناولت دواءً كبيراً نسبياً، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور.

## تنبيهات

فترة الحمل:



وفقًا لاختبارات الحيوانات، قد يؤدي دواء بريجابالين الجنين. لا توجد معلومات كافية متاحة عن سلامة هذا الدواء للحوامل. أثناء العلاج بهذا الدواء، يجب اتخاذ الاحتياطات لمنع النساء من الحمل أثناء استخدام هذى العقار

الرضاعة الطبيعية :



لم يؤكد أن استخدام العقار معتمد للأمهات المرضعات. لا ينصح باستخدامه.

الأطفال والرضع:



لم تحدد درجة الأمان للأطفال والفتيان، لذلك يجب استشاره دكتور الاطفال.

كبار السن :



لا مشاكل خاصة اثناء استخدام العقار.

اثناء قيادة السيارة :



يتحتم الامتناع عن السياقة حتى تتوضح ماهية أثر العقار،  
حيث من المحتمل ان يحدث ضبابية طمس.

اثناء العملية الجراحية والتخدير :



يتحتم إشعار المعالج الجراح او المعالج المخدر عن  
استخدام هذا العقار.

### أثار جانبية للدواء بريجابالين

عموم الأدوية قد تنجم عن تأثيرات جانبية. ومع ذلك،  
فبعض الناس قد لا يصاب بأي من التأثيرات الجانبية أو قد  
يصاب ببعض التأثيرات الجانبية الخفيفة.

ناقش طبيبك أو احصل على المساندة الطبية إذا ضايقتك أو لم تتلاشى أي من هذه التأثيرات الجانبية أو أي تأثيرات جانبية أخرى:

- الإحساس بدوخة، أو نعاس، أو كسل، أو ضعف.
- ارتفاع الوزن.
- فقدان القدرة على التركيز.
- وجع في الراس (الصداع).
- جفاف الفم.
- الإمساك.
- زيادة القابلية للأكل.
- الغثيان.
- وجع في المفاصل.
- تهيج الأنف أو الحلق.

⚠ هذه ليست كل التأثيرات الجانبية التي قد تحدث. إذا راودتك

أي أسئلة عن الأعراض الجانبية، تحدث مع طبيبك.

## تداخلات عامة للدواء

قد تؤدي الأدوية التي لها تأثيرات مثبطة على الجهاز العصبي المركزي إلى زيادة احتمالية حدوث آثار جانبية (عدم الانتباه، والدوخة، والارتباك، والاكتئاب التنفسي)، وخصوصاً عند:

- كبار السن
- الذين لديهم تاريخ الإصابة بالأمراض العقلية
- الأشخاص المعرضين لخطر الانتحار
- الأشخاص الذين يتعاطون الكحول والمخدرات

عند الجمع بين هذه الأدوية، استخدم أقل جرعة ممكنة (بعد استشارة الطبيب)، وامتنع عن الأنشطة التي تتطلب الانتباه

⚠ يجب إشعار الطبيب بأي آثار جانبية غير طبيعية ومتواصلة.

## طريقة تخزين بريجابالين



- ✓ في الحاوية الأصلية
- ✓ درجة حرارة الغرفة
- ✓ مكان جاف
- ✗ يحظر التخزين في الحمام
- ⚠ احفظ الدواء بعيداً عن الرطوبة وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- ⚠ قد يساعد الصندوق المقفل أو المنطقة المغلقة في الحفاظ على هذا الدواء آمناً.

## تراكيز بريجابالين الصيدلانية



- بريجابالين ٢٥ مليغرام
- بريجابالين ٥٠ مليغرام
- بريجابالين ٧٥ مليغرام
- بريجابالين ١٥٠ مليغرام
- بريجابالين ٢٢٥ مليغرام
- بريجابالين ٣٠٠ مليغرام

# لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدليات الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc\_Riyadh

You  
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM1.21.0001188

