



مدينة الملك فهد الطبية  
King Fahad Medical City



لورنوكسيكام

Lornoxicam

## ما هو لورنوكسيكام؟

لورنوكسيكام دواءً مضاد للالتهاب غير ستيرويدي ومضاد للروماتيزم من الأوكسيكام.

### دواعي الاستخدام:

علاج قصير الأمد للأعراض الألم الحاد الخفيف إلى المتوسط عند البالغين.

علاج أعراض الآلام والالتهابات في هشاشة العظام عند البالغين.

علاج أعراض الآلام والالتهابات في التهاب المفاصل الروماتويدي عند البالغين.

## ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن يمكن أن يؤثر على المفاصل وغيرها في مناطق أخرى من الجسم مما ينتج عنه أضرار في أجهزة الجسم. ونتيجة لذلك قد يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم بالخطأ.



## موانع استخدام لورنوكسيكام:

1. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه لورنوكسيكام أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

2. إذا كنت شديدة الحساسية لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى بما في ذلك حمض أسيتيل الساليسيليك (على سبيل المثال، الأسبرين).
3. إذا كنت تعاني من قلة الصفائح (انخفاض عدد الصفائح الدموية) الذي يزيد من الخطورة للإصابة به.
4. نزيف أو كدمات.
5. إذا كنت تعاني من قصور حاد في القلب.
6. إذا كنت تعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.
7. إذا كان لديك تاريخ سابق لنزيف أو ثقب في الجهاز الهضمي، متعلق بعلاج سابق.
8. مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
9. إذا كنت تعاني من قرحة هضمية نشطة أو لديك تاريخ سابق لقرحة هضمية متكررة.
10. إذا كنت تعاني من قصور شديد في الكبد.
11. إذا كنت تعاني من قصور شديد في الكلى.

12. إذا كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.
13. يجب تجنب استخدام لورنوكسيكام إذا كنت تتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى مثل حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين)، ومثبطات الإيبوبروفين.

### المحاذير والاحتياطات:

تحذث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول لورنوكسيكام إذا كان:

1. لديك خلل في وظائف الكلى.
2. لديك تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.
3. تعاني من التهاب القولون التقرحي.
4. لديك تاريخ من النزيف.
5. لديك تاريخ مرضي من الربو.
6. تعاني من مرض الذئبة الحمراء.

## الحمل والرضاعة:

خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل، لا يتم العلاج باستخدام لورنوكسيكام مالم ينصح طبيبك بذلك.

يجب ألا تتناول لورنوكسيكام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

**الشكل الصيدلاني:**



يوجد عدة أشكال وتركيبات:

لورنوكسيكام ٨  
ميكيلغرام اقراص

لورنوكسيكام ٤  
ميكيلغرام اقراص

لورنوكسيكام حقن

## الجرعة:

تتراوح جرعة الأقراص المعتادة للبالغين من 8 إلى 16 ملجم، مقسمة على جرعتين أو ثلاثة جرعات على أن لا تزيد عن 16 مليغرا姆 يومياً.

**الحقن:** 8 مليغرا姆 كجرعة واحدة، ولا تتجاوز الجرعة القصوى اليومية 24 مليغراם خلال أول 24 ساعة، والجرعة القصوى في اليوم التالي تكون كالأقراص 16 مليغرا姆 ويفضل أن لا تزيد عن يومين.



لا ينصح باستخدام لورنوكسيكام للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بسبب نقص الدراسات التي تبين مناسبة هذا العلاج لهم.

## آلية أخذ العلاج:

- ✓ الأقراص عن طريق الفم مع الطعام.
- ✓ الحقن عن طريق الوريد أو العضل بواسطة الطبيب أو الممرضة.

## بداية الفعالية:

يصل الدواء أقصى مستوياته في الدم خلال **ساعة** من تناوله.

## مدة الفعالية:

عمر النصف دواء حوالي 3 - 4 ساعات.

## التخزين:

يحفظ في عبوة مغلقة في درجة حرارة الغرفة 20-25 درجة مئوية.



**إذا تناولت لورنوكسيكام أكثر مما ينبغي:**

يرجى الذهاب إلى المستشفى عند تناول جرعة زائدة لورنوكسيكام إذا توفرت أحد هذه الأعراض التالية:

غثيان، قيء، أعراض مرتبطة بالجهاز العصبي المركزي (مثل الدوحة أو اضطرابات في الرؤية).

وهناك أعراض شديدة مثل التر拿ح (صعود إلى غيبوبة وتشنجات) وتليف الكبد والكلى وربما قد تحدث أيضاً اضطرابات التخثر.

### **الآثار الجانبية المحتملة:**



قد يسبب لورنوكسيكام في زيادة فرص الإصابة:

1. بأمراض القلب أو سكتة دماغية إذا كنت تعاني من أي أعراض غير طبيعية في البطن مثل نزيف في البطن، وطفح جلدي يجب التوقف عن تناولها والذهاب إلى أقرب مركز رعاية صحية.

2. ضيق في التنفس، آلام في الصدر، أو انتفاخ في الكاحل.
3. ألم شديد أو مستمر في المعدة.
4. اصفرار الجلد والعينين بسبب مشاكل في الكبد.
5. انتفاخ الوجه، الشفتيين، اللسان، أو الحلق بسبب الحساسية التي قد تنتج عنها صعوبة في التنفس.
6. متلازمة ستيفنز جونسون.

### الآثار الجانبية الشائعة:



صداع خفيف، غثيان، آلام في البطن، اضطراب في المعدة،  
إسهال وقيء.

**ما هي التداخلات الدوائية للورنوكسيكام؟**



يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية:

1. ديجوكسين.
2. سيكلوسبورين.
3. ميثوتريكسايت.
4. وارفارين.
5. ليثيوم.
6. سيميتيدين.
7. مدر البول (مثل: هيدروكلوروثيازيد).
8. مثبط الانزيم المحول للانجيوتنسين، (مثل: كابتوبيريل).

# لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدليات الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc\_Riyadh



KfmciRiyadh



8001277000

HEM1.21.0001313

