



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



توفاسيتينيب

Tofacitinib

الاشكال الدوائية:

Xeljanz ➤

- 5 ملغ

- 10 ملغ

Xeljanz XR ➤

- 11 ملغ

- 22 ملغ

ماهي استخدامات دواء:

- يستخدم هذا الدواء للبالغين المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي النشط بشكل معتدل إلى شديد (مرض مناعي ذاتي طويل الأمد يهاجم فيه جهازك المناعي المفاصل بشكل أساسي)، وذلك للمرضى اللذين لم تحدث لهم استجابة جيدة ل الميثوتريكسيت.
- البالغون المصابون بالتهاب المفاصل الصدفي النشط (نوع من التهاب المفاصل) والذي لم يعطي فيه الميثوتريكسات أو الأدوية الأخرى المشابهة المعروفة باسم "الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة لسير المرض" نتيجة جيدة.
- البالغون المصابون بالتهاب القولون التقرحي بشكل معتدل إلى شديد النشاط (نوع من مرض التهاب الأمعاء).

- مصرح به لعلاج إلتهاب المفاصل الرثوي وأثبت فاعليته في علاج الثعلبة فكلاهما مرض مناعي.
- كما يتم وصفه لعدة أسباب أخرى بعد استشاره الطبيب.

بعض المعلومات التي يجب معرفتها اثناء

استخدام الدواء:

- يجب اعلام جميع مقدمي الرعاية الصحية بأنك تتناول هذا الدواء.
- قم بأخبار طبيبك بأي اصابة فيروسية قبل أو بعد العلاج.
- تحتاج لفحص وظائف الكبد اثناء استخدام العلاج.
- يجب اجراء فحوصات للدم حسب تعليمات الطبيب.
- إذا كنت تتناول أو تشرب عصير الجريب فروت بكثرة أخبر طبيبك.
- قد يؤثر على بعض نتائج التحاليل المخبرية و يجب اخبار العاملين في المختبر بأنك تتناول هذا الدواء.

- قد تزيد فرصة الإصابة بعدوى، ويجب المحافظة على تعقيم اليدين والابتعاد عن الناس المصابين بعدوى فايروس.
- للسيدات في حالة الحمل أو التخطيط للحمل يجب إخبار طبيبك.
- في حالة إرتفاع السكر في الدم يجب استشارة الطبيب .
- لا تقلق من رؤية قشرة الاقراص في البراز فهذا أمر طبيعي .



طريقة تناول الدواء:

- تناول الدواء عند الأكل أو قبل الأكل.
- أخذ الدواء على حسب تعليمات الطبيب حتى لو شعرت بالتحسن.
- لا تتناول أكثر من الجرعة الموصوفة.
- تبلع حبة كاملة بدون مضغ أو كسر أو طحن.
- تخزن الأقراص في العلبة نفسها .
- إذا كان العلاج عبارة عن محلول فموي، فيحفظ العلاج في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء وتنتهي صلاحيته بعد الفتح ب 60 يوما.
- لا تشارك الدواء مع أشخاص آخرين أو تتناول الدواء الخاص بشخص آخر.
- إذا تناولت جرعة زائدة اتصل بمركز مكافحة السموم.

في حالة نسيان تناول جرعة:

- اخذها في حالة تذكر الجرعة أما إذا كان وقت الجرعة قريب من وقت الجرعة الثانية فترك الجرعة الأولى.
- عدم أخذ جرعتين مع بعض.



بعض الاعراض الجانبية التي يجب إخبار الطبيب عند حدوثها على الفور:

- أعراض تحسس مثل: طفح جلدي أو حكة أو احمرار أو تورم أو بثور وقد يصاحبها حمى أو بدون حمى أو ضيق بالتنفس.
- وجود علامات لمشاكل الكبد .
- وجود الألم في الأذن أو الحلق أو الجيوب الأنفية أو الكحة أو زيادة البغلم.
- تغير في ضربات القلب أو التنفس.
- فقدان للوزن بشكل مفاجئ.
- ألم في العضلات.
- تغير في الجلد أو كتل.
- ألم شديد في المعدة ويزداد مع مرور الوقت.

بعض الأعراض الجانبية البسيطة عند حدوثها اطلب المساعدة من الطبيب لتخفيفها:

وقد لا يشعر بعض الناس بأي من هذه الأعراض ومنها :

- صداع
- اسهال
- قيء
- أعراض نزلات البرد



موانع الاستخدام:

يمنع استعمال الدواء دون استشارة الطبيب المختص
في الظروف الآتية:

- فرط الحساسية تجاه أي من مكون من مكونات الدواء.
- قصور حاد في وظائف الكبد.

يجب الحذر من استخدامه في الحالات التالية:

- أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.
- الإصابة بداء السكري.
- وجود التهابات حالية أو ماضية (مثل تلك التي تسببها الفطريات، والهربس)، أو عدوى مزمنة، أو في حال ظهور أعراض للعدوى.
- وجود مشاكل المعدة والأمعاء (القرحة، التهاب القولون التقرحي).
- تلقي المريض لأي نوع من التطعيمات قبل البدء بالعلاج أو أثناء العلاج.
- الإصابة بالربو أو الانسداد الرئوي المزمن.
- إذا كان المريض أو أحد من أقاربه مصاب بالسل.
- في حال تدني مستويات عدد الخلايا اللمفاوية (أقل من 500 خلية/3مم).
- وجود نقص في مستوى الهيموغلوبين بالدم.

يوجد بعض التداخلات الدوائية التي تتعارض مع

استخدام الدواء:

يجب إعلام الطبيب عن الفيتامينات، والمكملات

الغذائية قبل البدء بالعلاج.

يوصى بعدم استخدام الدواء مع الأدوية التالية:

- الأدوية المستخدمة في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.
- مضادات الفطريات مثل كيتوكونازول.
- المضادات الحيوية.
- سيكلوسبورين
- أدوية القلب وارتفاع ضغط الدم
- أدوية النوبات العصبية مثل: كاربامازيبين.
- أدوية السل.

طريقه تخزين توفاسيتينيب :

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
- يمنع تخزين الدواء في الحمام .
- احفظه في مكان بعيد عن متناول الأطفال .



لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

(اقسم الصيدليات الداخلية)



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM1.21.0001320

