



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



أوباجيو 14 مغ

Teriflunomide (Aubagio) 14mg

ما هو أوباجيو:



يحتوي أوباجيو على المادة الفعالة تيريفلونوميد وهو عامل مُعدّل مناعي يعمل على ضبط الجهاز المناعي للحد من هجومه على الجهاز العصبي.

ماهي دواعي استعمال أوباجيو:

يستخدم أوباجيو لدى البالغين لعلاج الحالات الانتكاسية من التصلب العصبي المتعدد.

ما هو مرض التصلب المتعدد

مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي الذي يتألف من الدماغ والحبل الشوكي.

في التصلب المتعدد يدمر الالتهاب الغمد الواقى والذي يطلق عليه اسم (الميالين) المحيط بالأعصاب في الجهاز العصبي المركزي يعرف هذا التطور بزوال الميالين وهي تمنع الأعصاب من العمل بشكل صحيح. مما يؤدي إلى اختلال عمل الجهاز العصبي المركزي.

يعاني الأشخاص المصابون بالحالة الانتكاسية من التصلب المتعدد من نوبات متكررة (انتكاسات) من أعراض بدنية ناتجة عن خلل في عمل جهازهم العصبي.

تختلف أعراض الحالات الانتكاسية بين مريض وآخر
ولكنها تتضمن عموماً:

صعوبة المشي.

اضطرابات بصرية.

شعور بعدم التوازن.

قد تختفي الأعراض تماماً بعد انتهاء النوبة الانتكاسية، لكن مع مرور الوقت، قد تدوم بعض الأضرار بين النوبات الانتكاسية. قد يسبب هذا الأمر إعاقات بدنية من المحتمل أن تؤثر على نشاطات اليومية.

آلية عمل أوباجيو:

يساعد أوباجيو على حماية الجهاز العصبي المركزي من هجمات الجهاز المناعي عن طريق الحد من تكاثر بعض أنواع خلايا الدم البيضاء (الخلايا اللمفاوية).
مما يحد من الالتهاب الذي يصيب الجهاز العصبي.

ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول أوباجيو:

موانع الاستعمال:

 لا تتناول أوباجيو إذا كنت تعاني من حساسية تجاه عقار تيريفلونوميد أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (لاكتوز احادي الهيدرات ونشاء الذرة، السليلوز دقيق التبلور، جليكولات نشأ الصوديوم (النوع أ)، هيدروكسي يروبيل سليلوز، ستيرات المغنيسيوم، هيروميلوز، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، التالك الماكروغول 8000، لون أزرق غامق نيلى "إنديغو كارمن" E132 .

لا تتناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من مشاكل 

حادة في الكبد.

لا تتناولين هذا الدواء كنتِ حاملاً أو تعتقدين 

أنك قد تكونين حاملاً أو كنتِ امرأة مرضعة.

إذا كنت تعاني من مشكلة خطيرة تؤثر على 

جهاز المناعة لديك، على سبيل المثال متلازمة

نقص المناعة المكتسب.

إذا كنت تعاني من مشكلة خطيرة في النخاع 

العظمي، أو إذا كان لديك عدد قليل من خلايا الدم

الحمراء أو البيضاء في دمك أو لديك انخفاض في عدد

الصفائح الدموية.

إذا كنت تعاني من عدوى خطيرة. 

إذا كنت تعاني من مشاكل شديدة في الكلى 

تتطلب غسيل الكلى.

إذا كان لديك مستويات منخفضة جداً من 

البروتينات في دمك (نقص بروتينات الدم).

تحذيرات قبل الاستعمال:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل أن تستخدم أوباجيو، إذا:

 كنت تعاني من مرض في الكبد؛ سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم قبل وأثناء العلاج للتحقق من مدى جودة عمل الكبد. إذا أظهرت نتائج الفحوصات وجود مشكلة في الكبد، فقد يقوم الطبيب بإيقاف العلاج.

 إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم (فرط الضغط الشرياني) سواء كنت خاضعا للعلاج الدوائي أم لا. يمكن أن يسبب الدواء ارتفاع في ضغط الدم.

 إذا كان لديك عدوى. سيتأكد طبيبك من وجود ما يكفي من خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية قبل بدء العلاج. لأن أوباجيو يقلل من عدد خلايا الدم البيضاء في الدم مما قد يؤثر على قدرتك في مكافحة العدوى.

إذا كان لديك ردة فعل شديدة للدواء.



إذا كان لديك أعراض تنفسية.



إذا كان لديك ضعف وخدر وألم في اليدين



والقدمين.

إذا كنت ستخضع للتطعيم بأحد اللقاحات.



إذا كان لديك عدم تحمل اللاكتوز.



إذا كنت ستخضع لإجراء فحص دم معين



(فحص مستوى الكالسيوم).

ينبغي تجنب استخدام أوباجيو لدى الأطفال
والمراهقون دون سن 18 سنة. وذلك لأن آثار الدواء
في هذه الفئة العمرية غير معروفة

القيادة واستخدام الآلات:

قد يسبب أوباجيو شعور بالدوخة مما قد يقلل من قدرتك على التركيز والتفاعل إذا كنت معرضاً لذلك تجنب القيادة أو استعمال الآلات.

الأدوية الأخرى و أوباجيو:

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، أو قد تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى. وهذا يشمل الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. خاصة إذا كنت تتناول أيضاً مما يلي:

الليفلونوميد و الميثوتريكسيت والأدوية الأخرى التي تؤثر على الجهاز المناعي (غالباً ما تسمى مثبطات المناعة أو مُعدلات المناعة).

ريفامبيسين (دواء يستخدم لعلاج السل وغيره من حالات العدوى).

كاريامازيبين، الفينوباربیتال، الفينيتوين لعلاج الصرع.
نبته سانت جون (دواء عشبي لعلاج الاكتئاب).
ريباغليينيد، بيوغليتازون، أو روسيغليتازون لعلاج داء السكري.
داونوروييسين، دوكسوروبيسين، باكليتاكسيل، أو تويوتيكان لعلاج السرطان.
الدولوكستين للاكتئاب، سلس البول أو أمراض الكلية لدى المصابين بأداء السكري.
ألوسيترون لعلاج الإسهال الشديد.
الثيوفيلين لعلاج الربو.
تيزانيدين مُرخي العضلات.
الوارفارين، أحد مضادات التخثر التي تُستخدم لزيادة سيولة الدم لتجنب تكون جلطات دموية.
أقراص منع الحمل الفموية (التي تحتوي على إيثينيل إستراديول وليفونورجستريل).

سيفاكلور، البنزيل بنسلين (البنسلين ج)، سيبروفلووكساسين لعلاج العدوى.
الإندوميثاسين، الكيتوبروفين للألم أو الالتهاب.
فوروسيميد لعلاج الأمراض القلبية الوعائية.
السيميتيدين لتقليل حموضة المعدة.
زيدزفدين لعدوى فيروس نقص المناعة البشري
روزوفاستاتين، سيمفاستاتين، أتورفاستاتين، برافاستاتين لعلاج ارتفاع كوليسترول الدم.
سولفاسالازين لمرض التهاب الأمعاء أو التهاب المفاصل الروماتويدي.
كوليستيرامين لارتفاع الكوليسترول في الدم أو للتخفيف من الحكة الناجمة عن مرض الكبد.
الفحم المنشط لتقليل امتصاص الأدوية.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

لا تتناولي أوباجيو إذا كنتِ حامل أو تعتقدين 

أنك قد تكوني حامل. تزداد خطورة إنجاب طفل مصاب بعيوب خلقية أثناء تناول أوباجيو. يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب عدم تناول هذا الدواء دون استخدام وسائل منع الحمل الموثوقة.

أخبري طبيبك إذا كنتِ تخططين للحمل بعد 

التوقف عن العلاج بأوباجيو، حيث تحتاجين للتأكد من خروج هذا الدواء بالكامل من جسمك قبل حدوث حمل، وقد يستغرق الجسم للتخلص من المادة الفعالة مدة قد تصل لعامين بالشكل الطبيعي، لكن يمكن تقليل الوقت إذا رغبتِ بالحمل إلى بضعة أسابيع عن طريق تناول بعض الأدوية التي تسرع التخلص من المادة الفعالة.

في كل الحالات يجب التأكد بواسطة فحص الدم أن الجسم قد تخلص من المادة الفعالة بشكل كافٍ للسماح بالحمل.

أثناء وبعد استعمال العلاج أوباجيو يجب عليك استخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل. استمري في استخدام وسائل منع الحمل الفعالة بعد التوقف عن العلاج.

تحدثي مع طبيبك حول أفضل طريقة لمنع الحمل بالنسبة لك وأي وضع محتمل يدعوك لتغيير وسائل منع الحمل.

لا تتناولي أوباجيو أثناء الرضاعة الطبيعية، لأن تيريفلونوميد يفرز في حليب الأم.

استعمال أوباجيو:

يتم مراقبة المعالجة بواسطة أوباجيو من قبل طبيب
متمرس في علاج مرض التصلب المتعدد.

- ✓ يجب تناول هذا الدواء دائماً حسب إرشادات الطبيب.
- ✓ الجرعة الموصى بها هي قرص واحد يومياً.

شكل المستحضر

أقراص أوباجيو 14 مجم هي أقراص مغلفة بغشاء رقيق 14
مجم خماسية الشكل، ذات لون أزرق فاتح مطبوع على
جانب منها ('14') ومحفورة على الجانب الآخر شعار الشركة.

كيفية الاستعمال

- يعطى أوباجيو عن طريق الفم، والجرعة اليومية هي قرص لكل يوم يتم تناوله في أي وقت من أوقات النهار.
- يجب ابتلاع القرص كاملاً مع قليل من الماء.
- يمكن تناوله مع الوجبة أو بدونها.

الحالات الخاصة من تناول أوباجيو:

- إذا تناولت كمية كبيرة من أوباجيو، فاتصل بطبيبك فوراً، قد تعاني من بعض التأثيرات الجانبية.
- إذا نسيت أن تتناول إحدى الجرعات فلا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة فاتتة. تناول الجرعة التالية في الوقت المحدد.
- لا تتوقف عن تناول أوباجيو أو تغير جرعتك دون التحدث أولاً إلى طبيبك المعالج.

ماهي التأثيرات الجانبية؟

كما هي الحال مع كافة الأدوية فقد يسبب هذا الدواء بعض الآثار الجانبية، قد لا تحدث للجميع لكن يجب التنبيه للتالي:

الأعراض الجانبية الخطيرة:

أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت:

⊗ تلون الجلد أو بياض العين باللون الأصفر وبول أغمق

من الطبيعي أو غثيان وتقيؤ غير مبررين. فقد تكون

هذه أعراض اضطراب كبدي مما يستدعي قيام

بإجراء فحص مخبري للدم.

⊗ الحساسية التي قد تشمل أعراض الطفح الجلدي أو

تورم الشفاه أو اللسان أو الوجه أو صعوبة مفاجئة في

التنفس.

⊗ تفاعلات جلدية شديدة التي قد تشمل أعراض الطفح

الجلدي كالبثور أو تقرحات في الفم.

⊗ العدوى الحادة أو تعفن الدم (نوع من العدوى يمكن

أن يهدد الحياة) والتي قد تشمل أعراض مثل ارتفاع
في درجة الحرارة أو ارتجاف أو قشعريرة أو انخفاض
تدفق البول أو الارتباك.

⊗ التهاب الرئتين الذي قد يشتمل على أعراض ضيق
التنفس أو السعال المستمر.

⊗ التهاب البنكرياس الذي قد يشتمل على أعراض الألم
الشديد في منطقة البطن العلوية والتي قد تشعر بها
أيضا في الظهر مع الغثيان أو التقيؤ.

أعراض جانبية أخرى شائعة جداً:

⊗ صداع الراس

⊗ الإسهال والشعور بالغثيان.

⊗ زيادة في مستويات الدم لبعض الانزيمات الكبدية
التي تظهر في الفحوصات.

✖ إحساس بوخز جلدي.

✖ تساقط الشعر.

أعراض جانبية أخرى شائعة:

✖ عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

✖ التهاب المسالك البولية.

✖ التهاب الشعب الهوائية.

✖ التهاب الجيوب الأنفية.

✖ التهاب الحلق، صعوبة في البلع.

✖ التهاب المثانة.

✖ التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

✖ الهربس الفموي.

✖ التهاب الأسنان.

✖ التهاب الحنجرة.

✖ العدوى الفطرية في القدم.

✖ نقص غير طبيعي في مستوى كريات الدم البيضاء.

- ✖ تفاعلات تحسسية خفيفة.
- ✖ الشعور بالقلق.
- ✖ إحساس بالضعف أو الخدر أو الوخز أو الألم في أسفل الظهر أو الساق (عرق النسا)، الشعور بالخدر أو الحرق أو الوخز أو الألم في اليدين والأصابع (متلازمة النفق الرسغي).
- ✖ الخفقان.
- ✖ الحساسية خاصة على مستوى البشرة.
- ✖ حساسية الأعصاب.
- ✖ ارتفاع في ضغط الدم.
- ✖ القيء.
- ✖ وجع الأسنان.
- ✖ آلام البطن العلوي.
- ✖ طفح جلدي أو حب الشباب.
- ✖ ألم الأوتار والمفاصل والعظام وآلام العضلات.
- ✖ الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد.

⊗ طمث غزير.

⊗ الشعور بالضعف (الوهن).

⊗ فقدان الوزن.

أعراض جانبية أخرى قليلة الشبوع:

⊗ فقر الدم وانخفاض في عدد الصفائح الدموية.

⊗ اضطرابات الأظافر.

⊗ ألم ما بعد الصدمة.

أعراض جانبية أخرى نادرة:

⊗ الحساسية الشديدة.

⊗ رد الفعل الرئوي (مرض الرئة الخلالي).

⊗ التهاب الكبد والبنكرياس أو الفم/الشفيتين.

⊗ مستويات غير طبيعية من الدهون في الدم.

طريقة حفظ أوباجيو:

احفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال. 

لا تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ 

الصلاحية.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة 

مئوية.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلية الخارجية



@Kfmc_Riyadh



King-fahad-medical-city



KfmcRiyadh



8001277000



2

HEM1.22.0001408