



مدينة الملك فهد الطبية  
King Fahad Medical City



## انخفاض السكر في الدم

Hypoglycemia

## انخفاض أو نقص السكر بالدم:

هي حالة تتميز بانخفاض غير طبيعي لمستوى السكر (الجلوكوز) في الدم - المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم -. وغالباً يرتبط بعلاج مرض السكري.

- يمكن أن يصيب الأشخاص دون وجود مرض السكري فيدل على وجود مشكلة صحية أخرى.
- عندما يقل مستوى سكر الدم عن 70 مليغرام لكل ديسيلتر فهذا يعتبر هبوطًا في السكر ويجب علاجه فورا.



## **أعراض انخفاض السكر في الدم:**

- عدم القدرة على التركيز.
- تغير في المزاج.
- كثرة البكاء لدى الأطفال.
- فقدان الوعي.
- الجوع .
- التعرق .
- البرودة.
- الرعشة.
- خفقان القلب.
- شحوب الوجه.

## **أسباب انخفاض السكر في الدم:**

- قلة الأكل.
- أخذ جرعة الأنسولين وعدم تناولوجبة.
- زيادة جرعة الأنسولين دون استشارة الطبيب.
- مزاولة الرياضة بشكل مكثف دون تناولوجبة خفيفة قبلها.

## إذا شعر المريض بأعراض انخفاض السكر (وهو شبه واعي) :

ينصح باستخدام قاعدة 15 جرام لكل 15 دقيقة، وهي أن تأكل من الأغذية سريعة الامتصاص كالعصائر والسكريات ما يحتوي على مقدار 15 جرام من الكاربوهيدرات ثم تنتظر 15 دقيقة وتقيس مستوى السكر في الدم فإن بلغ الحد الأدنى (3.9 ملي مول/لتر أو 70 ملي جرام/د لتر) تناول وجبة خفيفة.

ويعيد الكرة مرة أخرى إلى أن يصل المستوى المطلوب، ثم بعد ذلك من الممكن تناول وجبة خفيفة.

**بعض الأغذية التي تحتوي حوالي 15 جرام من الكاربوهيدرات:**

- $\frac{1}{2}$  كوب عصير تفاح أو برتقال.
- كوب حليب.
- 4 حبات جلوكوز.
- 2 ملعقة (شاي) سكر.
- 2 ملعقة (طعام) زبيب.
- 3 ملعقة (شاي) عسل.
- 2 ملعقة (شاي) جيلي.

**في حال فقدان الوعي للمربيض :**

يجب إسعافه عن طريق إبرة الجلوكاجون، وعندما يستعيد المريضوعيه يجب إعطائه عصيرا محل ووجبة خفيفة على الفور، مع الاستمرار بفحص سكر الدم بجهاز قياس سكر الدم، كما يجب إعلام الطبيب بما حدث.

# لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

(قسم تثقيف المرضى بمركز السكر)



King-fahd-medical-city



@Kfmc\_Riyadh



KfmcRiyadh



8001277000

HEM2.16.000218

