



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



براميبكسول

Pramipexole

يصنف البراميبكسول - سيفرول منبه لمستقبلات الدوبامين

دواعي استعمال الدواء :



* يستخدم في علاج مرض الباركنسون .

* يستخدم في بعض حالات متلازمة تلمل الساقين.

الطريقة المثلى لاستعمال الدواء :



تناول هذا الدواء على معدة فارغة أو بعد تناول الطعام،

ويفضل تناوله بعد الطعام إذا كان يتسبب في تهيج أو

اضطراب المعدة .

الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء:



اخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية بتناولك لهذا العقار ومنهم : الأطباء ، والصيادلة ، والممرضات ، وأطباء الأسنان المعالجين لك.



إذا كان عمر المريض خمسة وسُتين عاماً أو أكثر، يجب تناول هذا الدواء بحذر شديد، لأنه يكون أكثر عرضه للآثار الجانبية .



تجنب تعاطي الكحول اثناء تناولك لهذا العقار .



إذا كنتِ حاملاً أو مرضعاً استشيري طبيبك قبل استخدام الدواء .

التأثيرات الجانبية الشائعة لهذا الدواء :



- الإحساس بدوخة ودوار، لذلك يجب التحرك ببطء، والحذر عند صعود السلالم.



- غثيان أو قيء، ويمكن استعمال وجبات صغيرة والعناية بنظافة الفم، ومضغ اللبان "العلكة" للتخفيف من ذلك.



- إمساك. حاول أن تتناول السوائل والأطعمة المحتوية على ألياف، والمحافظة على الرياضة.



- صداع ، عدم القدرة على النوم.

- هلوسة أو هذيان.

يخزن في درجة حرارة الغرفة.	يحفظ بعيداً عن الضوء والرطوبة
كيفية تخزين هذا الدواء	
	يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

مايلزم فعله عند نسيان الجرعة :

- تناول الجرعة المنسية فور تذكرك .
- إذا حان الوقت للجرعة التالية ،فلا تتناول الجرعة المنسية، بل يجب اتباع مواعيد تناول الجرعات حسب التعليمات .

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

الصيدلة الإكلينيكية



HEM2.19.000708

