




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



أبيكسيبان

Apixaban

الأشكال الدوائية للأبيكسيبان:

أقراص

دواعي الاستعمال:

المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني ولكن لا يعانون من مشاكل في صمامات القلب (الرجفان الأذيني غير الرثوي)، ينصح الطبيب باستخدام الأبيكسيبان للوقاية من حدوث جلطات الدم في القلب والسكتات الدماغية.

يستخدم أيضا للمرضى الذين خضعوا لجراحة استبدال مفصل الورك أو الركبة في علاج ومنع التجلط الوريدي العميق والانسداد الرثوي

الأثار الجانبية:

- أي نزيف غير عادي.
- كدمات.
- براز أسود اللون.
- دم في البول أو البراز.
- صداع.
- دوار.
- ضعف غير عادي.
- نزيف الأنف غير المعتاد.
- النزيف المهبلي غير العادي.

موانع الاستعمال :

- حساسية مفرطة تجاه أي من مكونات الدواء.
- يجب على الحامل عدم استخدام الدواء لما له من تأثير في زيادة النزيف.

- على المريض تجنب تناول الدواء أثناء الرضاعة.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو أمراض الكلى أو مرض في صمامات القلب عليك اخبار الطبيب المعالج بذلك.
- إذا تعرضت لإصابة أو جراحة في العمود الفقري في الآونة الأخيرة.
- تناول أي أدوية أخرى تؤثر على تخثر الدم، مثل الوارفارين.
- لديك أي إصابات تنزف حالياً كثيراً ، مثل الجرح أو قرحة المعدة.

الجرعة:

من المعتاد تناول عقار أبيكسابان مرتين في اليوم، حاول تناوله في نفس الوقت كل يوم.

طريقة الاستعمال:

تناول أبيكسابان مع أو بدون طعام. يمكنك سحق الأقراص وخلطها بالماء أو عصير التفاح. ويجب ابتلاع هذا الخليط على الفور.

يمكن تناول أبيكسابان من قبل البالغين الذين تبلغ أعمارهم ١٨ عامًا فما فوق

- يجب تناول الدواء بمجرد أن تتذكر ، ما لم يكن الوقت قد حان لجرعتك القادمة.
- لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة السابقة.
- خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد، ثم استمر كالسابق.
- من المهم جدًا أن تتذكر أن تتناول أبيكسابان يوميًا

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

إدارة الخدمات الصيدلانية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM2.19.000926

