



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



ساكوبترييل + فالسارتان

Sacubitril & Valsartan

الأشكال الدوائية:

أقراص ويتوافر على ثلاثة تراكيز:

٥٤ ملغم: عبارة عن (٤٢ ملغم ساكوبتريل + ٢٦ ملغم فالسارتان).

٤٩ ملغم: عبارة عن (٤٩ ملغم ساكوبتريل + ١٥ ملغم فالسارتان).

٩٧ ملغم: عبارة عن (٩٧ ملغم ساكوبتريل + ٣٠ ملغم فالسارتان).

دواعي الاستعمال:

ارتفاع ضغط الدم

الأثار الجانبية:

- شعور بالدوخة
- هبوط ضغط الدم
- ارتفاع البوتاسيوم مما يؤدي إلى بطيء معدل ضربات القلب، وضعف النبض، وضعف العضلات، والشعور بالوخز

موانع الاستعمال:

- فرط الحساسية تجاه أي من مكونات الدواء.
- لا ينبغي استخدامه أثناء فترة الحمل مما قد يسبب تشوهات خلقية للجنين.

- تجنب شرب الكحول حيث يساعد على زيادة انخفاض ضغط الدم.

الجرعة:

- ✓ من المعتاد تناول هذا الدواء مرتين في اليوم، ويتم تعديل الجرعة على حسب الاستجابة للدواء.
- ✓ يمكنك تناوله مع أو بدون طعام مع مراعاةأخذ الدواء في نفس الوقت كل يوم.

عند نسيان تناول الجرعة الدوائية، ينبغي تناولها فور التذكر، في حال كان موعد الجرعة القادمة قريباً تجاوز الجرعة المنسية وتناول الجرعة التالية في موعدها يمنع تناول جرعة مضاعفة

التدخلات الدوائية:

- ✓ تجنب استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على البوتاسيوم أثناء استخدام الدواء.
- ✓ قبل استخدام هذا الدواء، قم بإبلاغ الطبيب عن قائمةك الحالية من الأدوية.

احتياطات الاستخدام:



يمنع استعمال الدواء أثناء فترة الحمل لأنه يحوي فالسربتان الذي يسبب تشوهات للجنين.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلة الخارجية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh



KfmcRiyadh



8001277000



HEM2.19.000942