



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



دواء إيبكلوسا

Epclusa

إيبكلوسا دواء يحتوي على مادتين فعالة في قرص واحد

هما:

- سوفوسبوفير **Sofosbuvir** ٤٠٠ ملغم
- فيلباتاسفير **Velpatasvir** ١٠٠ ملغم

الغرض من استخدامه:

يعطى للمرضى المصابين بالعدوى الفيروسية المزمنة
للكبد وتسمى التهاب الكبد C (طويل الأجل).

تعمل المواد الفعالة معاً في هذا الدواء على إيقاف نوعين من
البروتينات المختلفة التي يحتاجها الفيروس للنمو وإعادة
إنتاج نفسه والقضاء على العدوى بشكل نهائي من الجسم.

في بعض الأحيان يؤخذ إيبكلوسا مع دواء آخر

يسمى الريبافيرين **Ribavirin**.



قبل تناول الدواء:

- ⚠ هذا الدواء للبالغين الذين أعمارهم ١٨ عام فما فوق.
- ⚠ لقد تم وصف الدواء لك لا تشاركه الآخرين فقد يضرهم.
- ⚠ لا تتناول هذا الدواء إذا كانت لديك حساسية من

المادتين:

- سوفوسبوفير
- فيلباتاسفير
- في حال استخدمت الدواء وظهرت لديك أعراض الحساسية **أوقف الدواء وأخبر طبيبك فوراً.**

أخبر طبيبك



١ - إذا كنت تستخدم أيًا من الأدوية التالية

قبل تناول الدواء:

- بعض المضادات التي تستعمل لعلاج العدوى، ومنها:
 - السل ريفامبيسين **Rifampicin**
 - ريفابوتين **Rifabutin**

- دواء عشبي، نبتة سانت جون **St. John's wort**
- أدوية تستعمل لعلاج الصرع ومنع النوبات:
- كاربامازيبين **Carbamazepine**
- الفينوباربيتال **Phenobarbital**
- الفينيتوين **Phenytoin**
- علاجات لعدوى فيروس نقص المناعة البشري (HIV) ،
يجب على طبيبك مراقبتك عن كثب.
- تناول أو تناولت خلال الأشهر الماضية دواء يعالج عدم
انتظام ضربات القلب (أميودارون **Amiodarone**) قد
يأخذ طبيبك بعين الاعتبار اختيار علاجات بديلة.
- تناول أدوية لمشاكل في القلب.



إذا كنت تأخذ أي أدوية أخرى مع إيبكلوسا
من المهم أن تقرأ منشورات تلك الأدوية
فقد تتعارض الأدوية مع بعضها البعض.

٢ - إذا تعاني من مشاكل في:

الكبد، أو التهاب الكبد أو قد أجريت لك زراعة الكبد،



قد تحتاج للمراقبة عن كثب من قبل طبيبك

الكلى، حيث أنه لم يتم اختبار إيبكلوسا بشكل



كامل في المرضى الذين يعانون من بعض المشاكل

في الكلى.

٣ - إذا واجهت أثناء العلاج ضيق في التنفس، دوخة، خفقان أو

إغماء.

تحاليل الدم:



سيقوم طبيبك بعمل تحاليل للدم قبل

وأثناء وبعد العلاج بإيبكلوسا .

وذلك من أجل أن يتأكد من فعالية الدواء وتحديد لأي فترة

زمنية، وأيضاً نجاحه وأنت خالي من فيروس التهاب الكبد

سي.

الأطفال والبالغين:



لا يوجد هناك دراسات لاستخدام إيبكلوسا للأطفال والبالغين. لذلك لا يعطى لما هم أقل من ١٨ عام.

الأدوية التي لا تؤخذ مع إيبكلوسا:

لا تتناول أدوية أخرى تحتوي على سوفوسبوفير، وهي أحد المكونات الفعالة لإيبكلوسا. أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أحد هذه الأدوية:

- أميودارون **Amiodarone**
- ريفابنتين **Rifapentine**
- أوكسكاربازيبين **Oxcarbazepine**
- فومارات تينوفوفير دايزوبروكسيل **Fumarate**
- **Disoproxil Tenofovir**
- إيفافيرينز **Efavirenz**
- ديجوكسين **Digoxin**

- دابيجاتران **Dabigatran**
- مودافينيل **Modafinil**
- روسوفاستاتين **Rosuvastatin** أو الستاتينات
- **Statins** المستعملة لعلاج ارتفاع الكوليستيرول في الدم.
- الوارفارين وأدوية مضادات فيتامين K. قد يحتاج طبيبك إلى زيادة عدد مرات اختبارات الدم للتحقق من خطر التعرض للجلطة الدموية.

تناول إيبكلوسا مع أي من هذه الأدوية قد تعمل على إيقاف عمل الأدوية الخاصة بك وقد تجعل التأثيرات الجانبية أسوأ لذلك يحتاج طبيبك إلى ضبط جرعات الأدوية التي تتناولها أو جرعة إيبكلوسا أو إعطائك دواء مختلف.



استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستعمل أدوية لعلاج قرحة المعدة، أو ارتجاع حمضي وتشمل هذه الأدوية:

- مضادات الحموضة مثل هيدروكسيد الألمنيوم/
المغنيسيوم أو كربونات الكالسيوم
ينبغي أن تؤخذ هذه قبل ٤ ساعات على الأقل أو ٤
ساعات بعد إيبكلوسا.
- مثبطات مضخة البروتون مثل أوميبرازول،
النزوبرازول، رابيبرازول، بانتوبرازول وإيسوميبرازول
يجب أن تؤخذ إيبكلوسا مع الطعام عند استعمال
مثبط مضخة البروتون .
- مضادات مستقبلات H2 مثل فاموتيدين،
سيميتيدين، نيزاتيدين أو رانيتيدين.

يمكن لهذه الأدوية أن تقلل من كمية فيلباتاسفير
velpatasvir في الدم.



لذلك قد يعطيك الطبيب دواء بديل عن هذه الأدوية لعلاج قرحة المعدة أو الارتجاع أو يوصي بكيفية أو الوقت المناسب لأخذ هذه الأدوية.

تناول إيبكلوسا والطعام:

يمكنك تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

الحمل ومنع الحمل:



لا تعرف تأثيرات إيبكلوسا خلال فترة الحمل. إذا كنتِ حامل، أو تعتقدين أنك قد تكوني حامل أو تخططي لإرضاع طفلك، فإِطِلبِي من طبيبك المشورة قبل تناول هذا الدواء.

الرضاعة الطبيعية:

لا ترضعي طفلك طبيعياً أثناء العلاج بإيبكلوسا. غير معروف حتى الآن ما إذا كانت المادتين الفعالتين في

إيبكلوسا ، سوفوسبوفير أو فيلباتاسفير ، قد تمارن في حليب ثدي البشر.

قيادة السيارات واستخدام الآلات:

لا يؤثر إيبكلوسا في القدرة على قيادة السيارات أو استعمال الآلات أو المكائن.

الجرعة الموصى بها:

قرص واحد يوميًا لفترة ١٢ أسبوعًا.

كيف تتناول إيبكلوسا:

دائمًا تناول هذا الدواء حسب تعليمات الطبيب المعالج، تناول القرص كامل بدون أن تمضغ، أو تسحق أو تقسم القرص لأن له مذاق مر جدًا، إذا كنت تتناول مضادات الحموضة، فتناولها على حدة قبل ٤ ساعات على الأقل أو ٤ ساعات بعد إيبكلوسا.

في حال نسيانك تناول جرعة إيبكلوسا:

احسب الفترة التي مضت منذ آخر مرة تناولت فيها إيبكلوسا



- إذا تذكرت الجرعة في غضون ١٨ ساعة من الوقت الذي عادة ما تتناول فيه إيبكلوسا، فيجب أن تتناول قرصاً في أقرب وقت ممكن. ثم تناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد.
- إذا كانت بعد ١٨ ساعة أو أكثر من الوقت الذي عادة ما تتناول فيه إيبكلوسا لا تتناول الجرعة المنسية. انتظر الجرعة التالية وتناولها في الوقت المعتاد.

- ❌ لا تتناول جرعتان قريبتان من بعضهما
- ❌ لا تتوقف عن تناول هذا الدواء ما لم يخبرك طبيبك بذلك، من الضروري أن تكمل الدورة العلاجية الكاملة لإعطاء الدواء الوقت الكافي لعلاج عدوى فيروس التهاب الكبد C.

التأثيرات الجانبية:

يمكن لهذا الدواء أن يسبب تأثيرات جانبية، وقد لا تحصل للجميع أيّاً منها .

من التأثيرات الجانبية التالية الأكثر شيوعاً هي:

الصداع

التعب

الغثيان

في حال حدثت لك أحد هذه الأعراض أخبر طبيبك أو الصيدلي ويشمل ذلك أي تأثيرات جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة.

كيفية تخزين الدواء:

- احفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكورة على الدواء ويستعمل خلال ٣٠ يوم من بداية فتح القنينة.
- هذا الدواء لا يتطلب أي ظروف تخزين خاصة.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدلية الخارجية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM2.20.000966

