



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



قلم حقنة الإبينفرين

EpiPen

ماهو قلم حقنة الأبينفرين؟

قلم مصمم لإعطاء جرعة محددة من

الإبينفرين (الأدرينالين) باستخدام تقنية الحاقن الآلي

لمعالجة أعراض الحساسية الشديدة (فرط الحساسية).



ماهو الإبينفرين؟

هرمون يستخدم لتنشيط القلب وانقباض الأوعية الدموية

وتوسيع القناة التنفسية ومجرى التنفس.

ماهي الحساسية الشديدة (فرط الحساسية)؟

هي ردة فعل للجهاز المناعي لدى الإنسان نتيجة تعرضه
لمواد معينة مثل:



- بعض المأكولات (الفول السوداني)
- الأدوية (بعض المضادات الحيوية)
- أو لدغ الحشرات (كلدغة النملة أو النحلة)



أعراض الحساسية الشديدة (فرط الحساسية):

تورم الوجه والعينين وضيق مجرى التنفس

الدوخة والغثيان

التعرق

ضربات القلب الغير منتظمة

الاحمرار الشديد في الجلد

ألم في البطن

طريقة استخدامه:

اجعل هذا الدواء معك في جميع الأوقات.
يمكنك الاحتفاظ بعبوات إضافية من الدواء في العمل
والمدرسة والمنزل

عندما تواجهك هذه الحساسية الشديدة عليك علاجها
بالحقن قلم الإبينفرين الآلي مباشرة وذلك بالطريقة
الآتية:


❌ لا تضع مطلقاً أصابعك أو يدك على طرف القلم.

❌ لا تقم بإزالة لسان الأمان حتى تكون مستعداً

لاستخدام الدواء.

✅ عندما تكون جاهزاً للاستعمال القلم، أخرجه من

الجراب.



✓ امسك القلم مع جعل الطرف

متجها للأسفل.

✓ انزع لسان الأمان.


✓ قم بالوخز بشكل مستقيم في

الجانب الخارجي من الفخذ وذلك

بتثبيته عشر ثواني على الأقل

حتى يتم دخول كمية الدواء

كامله للجسم.



الجرعة المخصصة للبالغين والأطفال فوق وزن

ثلاثون كيلو غرام هي ٣٠٠ مايكرو غرام إبينيفرين.

الجرعة للأطفال بوزن (٣٠-١٥) كيلو غرام هي

٥٠ مايكرو غرام إبينيفرين.



✓ قم بالتدليك للمنطقة بعد

الحقن لمدة عشر ثواني

لتسريع عملية امتصاص

وانتشار الدواء

✓ يجب عدم الحقن في أي مكان آخر مثل الوريد لأن فيه

خطورة على حياة المريض

تحذيرات واحتياطات:

يجب إخبار طبيبك قبل صرف الحقنة إذا كان لديك بعض أو
من التالي:

- مرض السكر
- أمراض القلب
- ارتفاع ضغط الدم
- ارتفاع ضغط
- زيادة نشاط الغدة
- العين (جلوكوما)
- الدرقية

- خلل في وظائف الكلى
- ورم الغدة الدرقية
- مرض الربو
- مرض البروستات

الأعراض الجانبية لهذا الدواء:

قد تظهر على القليل من المرضى وتزول خلال دقائق إلى ساعات ومنها:

اضطراب المعدة

زيادة العصبية

رجفة وتوتر

الدوار

الشعور بالإرهاق
والضغط

حالة عدم الاستقرار

طريقة الحفظ :

- يحفظ في درجة حرارة الغرفة.
- لا يحفظ في الثلاجة أو الفريزر.
- تجنب تعرضه للحرارة أو الضوء.
- عند النظر للسائل داخل القلم يجب أن يكون شفاف ولا يوجد فيه شوائب أو تعكر حتى يكون صالح للاستخدام.
- يجب التأكد من تاريخ الصلاحية بشكل مستمر لسلامة المريض.

من الأسماء التجارية لهذا الدواء:

إيبي بن

توين جيكت

آدريناكليك

جيكست

أوفي كيو

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلية الخارجية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM2.20.000973

