



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



أمانتادين

Amantadine

اسم الدواء العلمي: أمانتادين

يستخدم أمانتادين لعلاج:

- مرض باركنسون.
- الآثار الجانبية التي تسببها بعض الأدوية الأخرى.



ماهي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

- تناوله في وقت مبكر من اليوم لتلافي مشاكل النوم.



- يمكنك تناوله بدون الطعام أو معه إذا كان يتسبب في اضطراب المعدة.



- يمكنك نشر محتويات الكبسولة على طعام لين أو على سائل، **ولا يمضغ الدواء**.



- حالة تعذر بلع الحبوب، يتوفر هذا الدواء في شكل سائل (شراب).
- يستطيع الأشخاص الذين يستخدمون أنابيب تغذية استخدام السائل أيضاً.
- *نظف أنبوب التغذية قبل تناول الدواء وبعده.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول هذا الدواء؟

- احرص على استشارة طبيبك إذا كنت:

ترضعين رضاعة طبيعية	حاملًا أو تخططين للحمل	مصاب بنوبات صرع	تعاني من اضطراب نفسي
---------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

- راجع كل العقاقير التي تتناولها مع طبيبك، فقد لا ينسجم هذا العقار جيداً مع العقاقير الأخرى.



- احتفظ بقائمة بالعقاقير الخاصة بك مثل (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية والفيتامينات والعقاقير

المتاحة بدون وصفة وطبية)، وقدم هذه القائمة لطبيبك.



- اعتن بأسنانك، واذهب إلى طبيب الأسنان بشكل دوري.
- احرص **ألا** تتناول المشروبات الكحولية (مثل الخمر والجة) والمشروبات الكحولية المقطرة) أو الأدوية



الأخرى والمستحضرات الطبيعية التي تبطئ من أفعالك وردود أفعالك.

ما هي الآثار الجانبية التي قد يسببها هذا الدواء؟



- شعور بالدوار.
- شعور بالنعاس.
- انعدام القدرة على النوم.
- تغير في مستوى التفكير بوضوح.
- غثيان وقيء.

قد يساعد في ذلك تناول وجبات صغيرة متكررة، والعناية المتكررة بالفم، وتناول الحلوى الخالية من السكر، ومضغ العلكة الخالية من السكر.

• عدم وضوح الإبصار.

تجنب قيادة السيارة أو القيام بمهام أو أنشطة أخرى تتطلب منك اليقظة أو وضوح الإبصار حتى ترى تأثير هذا العقار عليك.

كيف تقوم بتخزين هذا الدواء؟



يخزن في درجة حرارة الغرفة.



تحفظ الكبسولات والأقراص بعيداً عن الماء.




يحظر تجميد السائل.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدلية الخارجية



HEM3.19.000824

