



الجرعة الزائدة من البنزوديازيبين -تعليمات الخروج-

Benzodiazepines overdose

- Discharge instruction -

البنزوديازيبينات هي أدوية تستخدم لعلاج:

والأرق

وانسحاب
الكحول

القلق

النوبات

وتشنجات
العضلات

تتضمن بعض الأمثلة: ألبرازولام وكلونازيبام وديازيبام ولورازيبام وتمازيبام .

⚠ يمكن أن تحدث جرعة زائدة إذا تناولت أكثر من الكمية الموصى بها، يمكن أن يحدث أيضاً إذا تناولت البنزوديازيبينات مع الكحول أو بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب ضرراً إذا تم تناولها معاً.

تعليمات الخروج:

اطلب من الشخص الذي يقوم برعايتك بالاتصال بالهلال الأحمر على الرقم 997 إذا فقدت الوعي أو كان لا يمكن إيقاظك.

توجهه إلى قسم الطوارئ إذا:

كنت تشعر بالنعاس الشديد، أو تجد صعوبة في البقاء مستيقظاً أو التحدث

كان كلامك غير واضح، أو أنك مرتبك

لديك مشكلة في المشي أو تحريك أجزاء من جسمك

تشعر بالقلق والغضب الشديد

⚠ كيف تتجنب الجرعة الزائدة من البنزوديازيبين؟

- تناول دوائك تماما كما تم توجيهك. لا تأخذ المزيد من الكمية الموصى بها من البنزوديازيبينات.
- لا تخلط البنزوديازيبينات مع الكحول أو مسكنات الألم الموصوفة أو العقاقير المجهولة، يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه المواد إلى جرعة زائدة مهددة للحياة.
- قم بتخزين البنزوديازيبينات في خزانة مغلقة أو في مكان لا يستطيع الأطفال الوصول إليه. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن كيفية التخلص من أي من أدوية البنزوديازيبين غير المستخدمة.

الاستشارة:

قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بمقابلة مستشار إذا كنت تسئ استعمال البنزوديازيبينات.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم مكافحة السموم



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM3.20.0001056

