



الجرعة الزائدة من هرمون الغدة الدرقية -تعليمات الخروج-

Thyroxine Overdose
- Discharge instruction -

يستخدم ليفوثيروكسين (T4) وثلاثي إيودوثيرونين (T3) لعلاج قصور الغدة الدرقية.

تساعد هرمونات الغدة الدرقية في التحكم في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والنمو والوزن.

يعد التعرض لمنتجات الغدة الدرقية أمراً شائعاً، ولكن الآثار السريرية نادرة. ترتبط معظم حالات السمية الشديدة بالتعرض المتكرر لفترات طويلة.

تعليمات الخروج

اتصل على 997 إذا كنت تعاني من أي مما يلي:

- لديك ألم مفاجئ في الصدر أو ضيق في التنفس.
- لديك نوبة تشنّج.



- قلبك ينبض أسرع من المعتاد.
- تشعر وكأنك ستصاب بالإغماء.

إرجع إلى قسم الطوارئ إذا:



- لديك حمى.
- تشعر بالتوتر والقلق.
- لديك رجفة، قشعريرة، أو تشعر بالضعف ومتألم على غير العادة .



بعد الخروج من الطوارئ:

- استرح وتجنب تجنب الأنشطة البدنية المجهدة والمرهقة. وابدأ تدريجياً في فعل المزيد كل يوم.
- عد إلى أنشطتك اليومية حسب التوجيهات.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم مكافحة السموم



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM3.20.0001058

