




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



الجرعة الزائدة من السالبوتامول -تعليمات الخروج-


Salbutamol Overdose
- Discharge instruction -

يستخدم السالبوتامول (البيوتيرول) بشكل أساسي
كموسع قصبي للربو أو أمراض الرئة الأخرى.

أشكال الدواء:



بخاخات



أقراص



شراب



حقن

تحدث السمية عند تناول الكثير من هذا الدواء للحد الذي
يسبب أضرار.

غالباً ما يتطلب تعاطي جرعات زائدة رعاية داعمة فقط.

يمكن استخدام الفحم النشط في حالة تناول جرعة
زائدة عن طريق الفم إذا قدم المريض مبكراً

تعليمات الخروج:

ارجع إلى قسم الطوارئ إذا كان لدى طفلك:

- علامات رد فعل تحسسي، مثل: الطفح الجلدي المثير للحكة، جلد أحمر أو منتفخ أو متقرح أو مقشر مع أو بدون حمى.
- ضيق في الصدر أو الحلق، أزيز، صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث، أو انتفاخ الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
- علامات ارتفاع ضغط الدم، مثل: صداع شديد أو دووار أو إغماء أو تغير في البصر.
- علامات انخفاض مستويات البوتاسيوم، مثل: آلام العضلات أو ضعفها أو تشنجات العضلات أو ضربات القلب الغير طبيعية.
- دقات قلب بطيئة، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو خفقان.

كيف تستخدم هذا الدواء بأمان؟

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لطفلك من (أطباء والممرضات والصيادلة وأطباء الأسنان) أن طفلك يأخذ هذا الدواء.
- لا تعط المزيد من هذا الدواء أو تجعل طفلك يستخدمه أكثر مما حدده لك الطبيب.
- أخبر الطبيب إذا كانت جرعة طفلك العادية لا تعمل بشكل جيد، أو إذا ساءت علامات طفلك، أو إذا كان طفلك بحاجة إلى استخدام هذا الدواء أكثر من المعتاد.
- إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم (السكري)، فستحتاج إلى مراقبة نسبة السكر في دمه عن كثب.
- احتفظ بجميع الأدوية في مكان آمن وبعيداً عن متناول الأطفال.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم مكافحة السموم

HEM3.20.0001059

