



لقاح ال BCG

BCG Vaccine



ماهي استخدامات لقاح ال BCG؟

- يستخدم ضد مرض السل الرئوي
- علاج لبعض سرطانات المثانة.

يقلل العلاج باستخدام ال BCG خطر تكرار المرض. والمداومة المستمرة باستخدام العلاج تقلل من خطر التقدم في سرطان المثانة.

تعليمات ما قبل البدء بالعلاج:

عليك إجراء مزرعة البول قبل أسبوع من الإجراء

إذا كنت خارج الرياض عليك إجراء مزرعة البول وإحضار النتيجة معك

عليك إجراء مسحة كورونا قبل يومين أو ثلاثة من الإجراء في حال لم تتلقى جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا

ماذا تتوقع خلال الإجراء؟

سيتم إدخال قسطرة بولية وتوصيلها بكيس بول.

سيتم وضع المحلول العلاجي في مثانة المريض من قبل الطبيب.

سيتم تثبيت القسطرة وإرشاد المريض إلى الاستلقاء على الظهر ثم البطن لمدة ١٥ دقيقة ثم الانعطاف من جانب إلى آخر لضمان توزيع الدواء جيداً على جميع أجزاء الغشاء المخاطي للمثانة.

سيبقى المحلول في مثانة المريض لمدة ساعتين.

ستتم إزالة القسطرة والحقيبة البولية بعناية وسيتم التخلص منها وفقاً لإرشادات مكافحة العدوى.



تعليمات الخروج بعد الإجراء:

• يجب على المريض التبول وهو جالس لتجنب تناثر البول

• يجب على المريض إفراغ المثانة بالكامل

• يجب على المريض غسل يديه والمنطقة التناسلية بالماء والصابون بعد التبول

• خلال الست ساعات الأولى بعد العلاج، يجب تطهير البول المُفرغ لمدة ١٥ دقيقة بكمية متساوية من المُبَيض المنزلي (الكلوركس) قبل سحب المرحاض.

• على المريض البقاء بالمنزل واستخدام نفس المرحاض لأول ست ساعات.

• على المريض زيادة شرب السوائل للمساعدة على تنظيف المثانة بعد الإجراء.

متى أتواصل مع الطبيب؟

يجب على المريض إخبار الطبيب عن ظهور أي من هذه الآثار الجانبية، وطلب المشورة الطبية الفورية مثل:

- الحمى والقشعريرة.
- الشعور بالضييق.
- أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.
- زيادة الإرهاق.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم التمريض التخصصي للعيادات
الخارجية



HEM3.21.0001265

