




تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster



الحالات الطارئة المتعلقة بالجهاز التنفسي

Respiratory
Emergency Situations

مقدمة

في الحالات الطارئة لابد أن يكون التدخل سريع وبشكل سليم، كما يجب الابتعاد عن الانفعال والخوف لأنه قد يعيق حركة الإنسان وتفكيره.

بشكل عام، اتبع الآتي في حالة الطوارئ:

١. لا تكن مذعوراً، فأنت بحاجة إلى انتباهك كله.
٢. قم بعملك بطريقة منظمة.
٣. عندما تقوم بإسعاف شخص ما، لا تحاول القيام بشيء فوق طاقتك.
٤. لا تعرض نفسك أو أي شخص آخر للخطر من أجل الحفاظ على ممتلكات أو متاع حيث أن الأشياء يمكن تعويضها أما الأشخاص فلا يمكن تعويضهم.



الحالات الطارئة المتعلقة بالجهاز التنفسي

التعرف على علامات وأعراض صعوبة التنفس وتقديم



الرعاية الطارئة في الوقت الصحيح هما

الأساس - بإذن الله - لمنع حدوث مضاعفات

خطيرة للمريض كتوقف التنفس.

الأنبوب الرغامي


نظرًا لتجاوز الأنبوب الرغامي في الرقبة لمجرى التنفس


العلوي والذي يقوم بتنقية الهواء وترطيبه، الشيء الذي قد

يؤدي إلى تراكم البلغم وانسداد الأنبوب. فمن الواجب

المحافظة على الترطيب واستخدام فلاتر للهواء لتجنب

حدوث ذلك.





انسداد الأنبوب الرغامي

هناك عدة مؤشرات تنذر بانسداد الأنبوب الرغامي بالنسبة للبالغين والأطفال، منها:

١. ظهور علامات الاختناق على المريض.
٢. انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.
٣. تغير لون المريض إلى اللون الأزرق.
٤. تغير معدل التنفس عن معدله الطبيعي وهو (١٢-١٦ نفس/دقيقة).
٥. صعوبة في التنفس.
٦. حشرجة وصفير عند دخول أو خروج الهواء.
٧. ارتفاع وانخفاض الصدر عند التنفس ضئيل جداً.
٨. عدم دخول الهواء إلى الرئتين عن طريق الأنبوب الرغامي باستخدام جهاز التنفس اليدوي إلى الرئة وصعوبة شديدة في ذلك.
٩. عدم دخول أنبوب شفط البلغم للعمق المعتاد.

في الحالات المتقدمة:


الإغماء وعدم استجابة المريض.

هناك عدة مؤشرات للأطفال منها:

أن يكون الطفل منزعج وغير هادئ وعلامات التعب والإجهاد ظاهرة عليه.

إذا كان المريض على جهاز التنفس:

يصدر الجهاز صوت جرس تحذيري في كل مرة يعطي فيها الجهاز نفس ميكانيكي مشيراً لارتفاع الضغط في صدر المريض.



قد تظهر جميع هذه المؤشرات أو بعضها وذلك على حسب مستوى الانسداد ومدى سرعة الاستجابة لحل المشكلة

ماذا نفعل في حال انسداد الأنبوب الرغامي؟



عند حدوث أو الاشتباه بحدوث
الانسداد كن هادئًا واطلب
المساعدة إذا كان ذلك ممكنًا و
قم بما يلي:

- محاولة شفط البلغم باستخدام أنبوب الشفط ومضخة
الهواء اليدوية مع القليل من المحلول الملحي المعقم.
عند عدم استطاعة شفط البلغم أو إجراء التنفس عن
طريق مضخة الهواء اليدوية يجب عمل الآتي:

(ا) إذا كان الأنبوب الرغامي يحتوي على أنبوب داخلي:

(a) فصل المريض من جهاز التنفس (إذا كان الأنبوب
موصول بجهاز التنفس)

(b) قم بإخراج الأنبوب الداخلي من الأنبوب الرغامي و
ضع الأنبوب الداخلي الاحتياطي في الفتحة. قم
بعمل التنفس الصناعي للمريض عن طريق

مضخة الهواء اليدوية موصولة باسطوانة

الأوكسجين وقم بشفط البلغم.

(c) استمر بعمل التنفس الصناعي للمريض حتى

تستقر حالته وتعود كما كانت قبل حدوث

الانسداد. في حال عدم استقرار حالة المريض بعد

تغيير الأنبوب الرغامي و بالرغم من دخول الهواء

إلى الرئتين بشكل طبيعي أو في حال عدم ارتياحك

لوضعه الصحي قم بالاتصال بالإسعاف (٩٩٧) حتى

يتم نقل المريض للمستشفى.

(٢) في حالة عدم استطاعة إدخال الهواء مرة أخرى بعد

تغيير الأنبوب الداخلي أو إذا كان الأنبوب الرغامي لا

يحتوي على أنبوب داخلي:

(a) يجب نزع الأنبوب الرغامي كاملاً و وضع الأنبوب

الرغامي البديل بمساعدة شخص آخر إن وجد.

(b) بعد تغيير الأنبوب الرغامي يجب نفخ بالون الأنبوب الرغامي بالهواء (إذا كان الأنبوب الرغامي من النوع الذي يحتوي على بالون داخلي) وإجراء التنفس الصناعي عن طريق مضخة الهواء اليدوية الموصولة باسطوانة الأوكسجين والتأكد من خروج ودخول الهواء من الأنبوب الجديد بشكل طبيعي ثم القيام بشفط البلغم وتثبيت الأنبوب بواسطة خيط التثبيت.

(c) استمر بعمل التنفس الصناعي للمريض حتى تستقر حالته وتعود كما كانت قبل حدوث الانسداد. في حال عدم استقرار حالة المريض بعد تغيير الأنبوب الرغامي و بالرغم من دخول الهواء إلى الرئتين بشكل طبيعي أو في حال عدم ارتياحك لوضعه الصحي قم بالاتصال بالإسعاف (٩٩٧) حتى يتم نقل المريض للمستشفى.

(٣) في حالة وجود صعوبة في إدخال الهواء بعد كل ما تقدم فيجب إخراج الأنبوب الرغامي وإقفال فتحة الرقبة عن طريق وضع شاش معقم على الفتحة واستخدام قناع الإسعافات الأولية مع مضخة الهواء اليدوية الموصولة باسطوانة الأوكسجين على الأنف والفم وعمل تنفس صناعي للمريض مع التأكد من فتح مجرى التنفس والفم والاتصال بالإسعاف (٩٩٧).

a) في هذه الحالة يجب أن يوضع المريض على ظهره ومراقبة تحرك الصدر مع التنفس وفي حالة عدم تحركه يجب تعديل وضع الرقبة والرأس للأعلى والأسفل مع متابعة إدخال الهواء وملاحظة الصدر لمشاهدة التحرك وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم. ويجب الاستعانة بشخص لتثبيت القناع وآخر لإدخال الهواء وملاحظة حركة الصدر ونسبة الأكسجين في الدم.

في حالة خروج الأنبوب الرغامي من فتحة الرقبة:

١. محاولة إعادة الأنبوب الرغامي في حالة عدم خروجه كلياً

مع التأكد من سهولة التنفس لدى المريض وارتفاع وانخفاض الصدر و معدل الأكسجين وضربات القلب طبيعي.

٢. عند خروج الأنبوب الرغامي كلياً من الفتحة يجب محاولة

إعادة أنبوب الطوارئ الجديد مع التأكد من سهولة التنفس لدى المريض وارتفاع وانخفاض الصدر و معدل الأكسجين وضربات القلب طبيعي.

٣. في حال عدم استقرار حالة المريض بعد تغيير الأنبوب

الرغامي و بالرغم من دخول الهواء إلى الرئتين بشكل طبيعي أو في حال عدم ارتياحك لوضعه الصحي قم بالاتصال بالإسعاف (٩٩٧) حتى يتم نقل المريض للمستشفى.

٤. عند فشل كل محاولات إعادة الأنبوب الرغامي يجب


اللجوء إلى الحل a٣ في الحالة السابقة.

في حالة صعوبة التنفس/الإغماء/شبه الإغماء

/نزول نسبة الأكسجين في الدم:

• بشكل عام عند حدوث أي مشكلة في التنفس أو حدث

طارئ يجب إجراء التنفس الصناعي عن طريق مضخة



الهواء اليدوية

الموصولة باسطوانة

الأوكسجين والتأكد

من خروج ودخول

الهواء مع مراعاة عمل الآتي:

١) عدم وجود بلغم أو ما قد يتسبب في انسداد الأنبوب

٢) دخول الهواء إلى الرئة وخروجه بالشكل الطبيعي.

٣) التأكد من سلامة التوصيلات من الأجهزة وعدم

وجود انسدادات أو تنسيم.

٤) عدم وجود مشاكل أخرى مثل التهابات وارتفاع أو

انخفاض السكر في الدم.

٥) عدم وجود حرارة مرتفعة في الجسم.

٦) يجب إتباع تعليمات الأخصائي أو نقل المريض إلى

المستشفى أو طلب الإسعاف في حالة عدم حل

المشكلة.

- في حال عدم استقرار حالة المريض بعد إجراء التنفس الصناعي عن طريق مضخة الهواء اليدوية الموصولة باسطوانة الأوكسجين و بالرغم من دخول الهواء إلى الرئتين بشكل طبيعي أو في حال عدم ارتياحك لوضعه الصحي قم بالاتصال بالإسعاف (٩٩٧) ليتم نقل المريض للمستشفى.

قاعدة أساسية:

يجب فصل المريض من أي جهاز وعمل التنفس الصناعي عن طريق مضخة الهواء اليدوية الموصولة باسطوانة الأوكسجين عند مواجهة أي مشكلة أو الشك بوجود خلل في أي من الأجهزة ومن ثم الاتصال بالأخصائي المختص.

من الواجب وبشكل يومي التأكد من وجود كمية كافية من الأوكسجين في الاسطوانة ومراعاة وجودها قرب المريض بشكل دائم مع كيس أدوات الطوارئ وجهاز شفط البلغم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

إدارة الرعاية الصحية المنزلية



@Kfmc_Riyadh



King-fahad-medical-city



KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.16.000140

