




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



دواء أزاثيوبرين

Azathioprine 10mg/ml

كيف يتم تخزين الدواء؟

يحفظ الدواء في الثلاجة ما بين ٢-٨ درجة مئوية.

تظل صلاحية الدواء لمدة شهرين من تاريخ الصنع.

يحفظ الدواء بعيداً عن الضوء والرطوبة وأشعة الشمس

وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.



تناول الدواء بعد الوجبات إلا إذا قال طبيبك غير ذلك.

يؤخذ كجرعة يومية واحدة أو على جرعات مقسمة أو

مع الطعام لتقليل عدم تحمل الجهاز الهضمي.

كيفية أخذ الدواء

كلما كان ذلك ممكناً، يجب أن تأخذ أزاثيرين بنفسك
واتبع الخطوات أدناه:

✅ إذا احتاج أحد أفراد العائلة أو صديق أو مقدم رعاية إلى
إعطاء أزاثيرين لك، فعليهم أيضاً اتباع هذه
الخطوات:

1. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة (٣٠ ثانية) كحد أدنى.
2. ارتدِ القفازات لتجنب لمس الدواء.
3. رجّ العلبة جيداً في كل مرة قبل الاستخدام.
4. قم بسحب الجرعة المناسبة بالتحديد إذا كان الشكل
الدوائي في علبة باستخدام (الحقنة الفموية) المدرّجة
بقياسات مل، لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة
واحدة.
5. يتم إعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

6. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

7. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في كيس بلاستيكي ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.

8. اغسل يديك بالماء والصابون.

أثناء إعطاء الدواء للمريض، إذا كان هناك احتمال أن تتناثر المادة أو إذا كان المريض قد يقاوم، فقم بارتداء واقٍ للعين والوجه.



كيف أتخلص من الدواء؟

إذا كان لديك أي أزيابورين غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المراض، يرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول

- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.


- عند ملامستها العين اغسلها جيداً بالماء أو غسول



العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا

الغرض لمدة ٥ دقائق على الأقل.

إذا انسكب المشروب من الزجاجاة امسحها على الفور بمنشفة رطبة وتخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعاً بمياه نظيفة.



تذكر



- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية أنك تتناول هذا الدواء، ويشمل الأطباء والممرضات والصيدلة وأطباء الأسنان.
- قد يكون لديك فرصة أكبر للإصابة بعدوى. اغسل يديك كثيرًا، ابتعد عن الأشخاص المصابين بالعدوى أو نزلات البرد.
- قد تنزف بسهولة أكبر، كن حذرا وحاول تجنب الإصابة قدر الإمكان، استخدم فرشاة أسنان ناعمة وماكينة حلاقة كهربائية.
- قم بفحص الدم كما قال لك الطبيب.
- قد تزداد فرصة الإصابة بسرطان الجلد، تجنب التعرض لأشعة الشمس والمصابيح الشمسية وأسرة التسمير، استخدم واقٍ من الشمس وارتدِ الملابس التي تحميك من

أشعة الشمس، قد تحتاج إلى فحص جلدك أثناء تناول هذا الدواء، تحدث مع طبيبك بهذا الخصوص.



قد يسبب هذا الدواء ضرراً للجنين، يجب استخدام وسائل منع الحمل أثناء تناول هذا الدواء.

إذا حملت، اتصلي بطبيبك.

أخبري طبيبك إذا كنت مرضعة،

سوف تحتاج إلى التحدث عن أي مخاطر على طفلك.

لحفاظ على نفسك وأهلك وإبقاء البيئة آمنة قدر الإمكان
اتبع التعليمات أدناه كل يوم طول فترة استخدام العلاج:

- يمكنك استخدام نفس المرحاض التي تستخدمها عادةً.

- في حالة اتساخ المرحاض أو مقعد المرحاض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمرحاض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض.
- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مرحاض طبي (**bedpan**)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتناس فضلات الجسم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدلية الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.21.0001172

