



مدينة الملك فهد الطبية  
King Fahad Medical City



دواء كابسيتلين

Capecitabine 10mg/ml

## كيف يتم تخزين الدواء؟

يحفظ الدواء في الثلاجة ما بين ٢-٨ درجة مئوية.

تظل صلاحية الدواء لمدة ١٤ يوم من تاريخ تحضير الدواء.

يحفظ الدواء بعيداً عن الضوء والرطوبة وأشعة الشمس  
وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.



تعامل مع الدواء بحذر، تماماً كما هو الحال عند  
إعطاء العلاج الكيميائي في الوريد، يمكن أن يكون  
هذا الدواء ساماً، ويجب الحد من تعرضه للآخرين.  
اترك الدواء في العبوة المرفقة حتى يصبح جاهزاً  
لتناوله.

## كيفية أخذ الدواء

كلما كان ذلك ممكّناً، يجب أن تأخذ كابساتيبين بنفسك  
وأتبع الخطوات أدناه:

إذا احتاج أحد أفراد العائلة أو صديق أو مقدم رعاية إلى ✓

إعطاء كابساتيبين لك، فعليهم أيضاً اتباع هذه

الخطوات:

- .1. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة (٤. ثانية) كحد أدنى.
- .2. ارتد القفازات لتجنب لمس الدواء.
- .3. رج العلبة جيداً في كل مرة قبل الاستخدام.
- .4. قم بسحب الجرعة المناسبة بالتحديد إذا كان الشكل الدوائي في علبة باستخدام (الحقنة الفموية) المدرجة بقياسات مل، لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة واحدة.
- .5. يتم إعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

6. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.
7. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في كيس بلاستيكي ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.
8. اغسل يديك بالماء والصابون.

أثناء إعطاء الدواء للمريض، إذا كان هناك احتمال أن تتناثر المادة أو إذا كان المريض قد يقاوم، فقم بارتداء واقٍ للعين والوجه.



## كيف أتخلص من الدواء؟

إذا كان لديك أي كابساتيبين غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المرحاض، يرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

## كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب محلول

- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين اغسلها جيداً بالماء أو غسول العين (متتساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة 5 دقائق على الأقل.



إذا انسكب المشروب من الزجاجة امسحها على الفور بمنشفة رطبة وتخليص منها في حاوية مغلقة مثل (كييس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاثة مرات باستخدام محلول منظف متبعاً بمياه نظيفة.



## التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات



نظرًا لأن كابسيتبيين يبقى في جسمك لعدة أيام بعد تناوله، فقد يكون بعض الدواء موجوداً في البول أو البراز أو العرق أو القيء.

للحفاظ على نفسك وأهلك وابقاء البيئة آمنة قدر الإمكان اتبع التعليمات أدناه كل يوم طول فترة استخدام العلاج:

- يمكنك استخدام نفس المرحاض التي تستخدموها عادةً.
- في حالة اتساخ المرحاض أو مقعد المرحاض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمرحاض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض.

- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مرحاض طبي (bedpan)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات المساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها باظهر بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتصاص فضلات الجسم.
- اغسل أي جلد تعرض لفضلات الجسم أو الدواء بالماء والصابون.
- يجب غسل البياضات (المفارش) أو الملابس المتسخة بسوائل الجسم أو فضلات الجسم بشكل منفصل عن البياضات والملابس الأخرى.
- إذا لم يكن لديك غسالة، ضع البياضات المتسخة في كيس بلاستيكي حتى يمكن غسلها.

- اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس البياضات (المفارش) أو الملابس التي قد تكون ملوثة بسوائل الجسم.

يجب على المرأة الحامل تجنب لمس أي شيء قد يكون ملوثاً بسوائل الجسم من المريض.



# لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلية الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc\_Riyadh



KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.21.0001173

