




دواء سايكلوفوسفامايد

(Cyclophosphamide 10mg/ml)

كيف يتم تخزين الدواء؟

يحفظ الدواء في الثلاجة ما بين ٢-٨ درجة مئوية.

تظل صلاحية الدواء لمدة 56 يوم من تاريخ تحضير الدواء.

يحفظ الدواء بعيداً عن الضوء والرطوبة وأشعة الشمس
وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.



تعامل مع الدواء بحذر، تمامًا كما هو الحال عند إعطاء العلاج الكيميائي في الوريد، يمكن أن يكون هذا الدواء سامًا، ويجب الحد من تعرضه للآخرين. اترك الدواء في العبوة المرفقة حتى يصبح جاهزًا لتناوله.

كيفية أخذ الدواء

كلما كان ذلك ممكناً، يجب أن تأخذ السايكلوفوسفاميد بنفسك واتبع الخطوات أدناه:

✓ إذا احتاج أحد أفراد العائلة أو صديق أو مقدم رعاية إلى إعطاء السايكلوفوسفاميد لك، فعليهم أيضاً اتباع هذه الخطوات:

1. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة (٤٠ ثانية) كحد أدنى.

2. ارتدِ القفازات لتجنب لمس الدواء.

3. رجّ العلبة جيداً في كل مرة قبل الاستخدام.

4. قم بسحب الجرعة المناسبة بالتحديد إذا كان الشكل الدوائي في علبة باستخدام (الحقنة الفموية) المدرّجة بقياسات مل، لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة واحدة.

5. يتم إعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

6. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

7. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في كيس بلاستيكي ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.

8. اغسل يديك بالماء والصابون.

كيف أتخلص من الدواء؟



إذا كان لديك أي السايكلوفوسفاميد

غير مستخدم، فلا ترميه في سلة

المهملات ولا تغسله في الحوض أو

المرحاض، يرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول

- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين اغسلها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة ٥ دقائق على الأقل.

إذا انسكب المشروب من الزجاجاة امسحها على الفور بمنشفة رطبة وتخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعاً بمياه نظيفة.



التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات



نظراً لأن السايكلوفوسفاميد يبقى في جسمك لعدة أيام بعد تناوله، فقد يكون بعض الدواء موجوداً في البول أو البراز أو العرق أو القيء.

لحفاظ على نفسك وأهلك وإبقاء البيئة آمنة قدر الإمكان
اتبع التعليمات أدناه كل يوم طول فترة استخدام العلاج:

- يمكنك استخدام نفس المراض التي تستخدمها عادةً.
- في حالة اتساخ المراض أو مقعد المراض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمراض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المراض.

- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مرحاض طبي (bedpan)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاظات أو شرشف لامتصاص فضلات الجسم.
- اغسل أي جلد تعرض لفضلات الجسم أو الدواء بالماء والصابون.
- يجب غسل البياضات (المفارش) أو الملابس المتسخة بسوائل الجسم أو فضلات الجسم بشكل منفصل عن البياضات والملابس الأخرى.
- إذا لم يكن لديك غسالة، ضع البياضات المتسخة في كيس بلاستيكي حتى يمكن غسلها.

- اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس البياضات (المفارش) أو الملابس التي قد تكون ملوثة بسوائل الجسم.

يجب على المرأة الحامل تجنب لمس

أي شيء قد يكون ملوثًا بسوائل

الجسم من المريض.



لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدلية الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.21.0001174

