



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



دواء إرلوتنب

Erlotinib 10mg/ml

طرق تخزين الدواء:



يحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة ما بين ٢٠-٢٥ درجة مئوية.	مكان التخزين
٨ يومًا من تاريخ تحضير الدواء.	مدة صلاحية الدواء

⚠ احفظ الدواء بعيدًا عن الضوء، الرطوبة، أشعة الشمس وبعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

تعامل مع الدواء بحذر، تمامًا كما هو الحال عند إعطاء العلاج الكيميائي في الوريد، يمكن أن يكون هذا الدواء سامًا، ويجب الحد من تعرضه للآخرين. اترك الدواء في العبوة المرفقة حتى يصبح جاهزًا لتناوله.

قبل تناول الدواء اتبع التعليمات التالية



كلما كان ذلك ممكنًا، يجب أن تعطي **الإرلوتنب** لنفسك واتبع الخطوات أدناه.

لكن إذا احتاج أحد أفراد العائلة أو صديق أو مقدم رعاية إلى إعطاء **الإرلوتنب** لك، فعليهم أيضًا اتباع هذه الخطوات.

- أثناء إعطاء الدواء للمريض، إذا كان هناك احتمال أن تتناثر المادة أو إذا كان المريض قد يقاوم، فقم بارتداء واقٍ (العين/الوجه).

خطوات تناول الدواء:

١. اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة (٤٠ ثانية) قبل وبعد لمس زجاجة الدواء.
٢. ارتدِ القفازات لتجنب لمس الدواء.
٣. رجّ العلبة جيدًا في كل مرة قبل الاستخدام.

٤. قم بسحب الجرعة المناسبة بالتحديد إذا كان الشكل الدوائي في علبة باستخدام (الحقنة الفموية) المدرجة بقياسات مل،

❌ لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة واحدة.

٥. يتم اعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

٦. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

٧. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في (كيس بلاستيكي) ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.

٨. اغسل يديك بالماء والصابون.

طرق التخلص من الدواء:



إذا كان لديك أي **إرلوتنب** غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المراض، فيرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول:



- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين شطفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة ٥ دقائق على الأقل.
- إذا انسكب المشروب من الزجاج امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعاً بمياه نظيفة.

التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات



نظراً لأن **إرلوتنب** يبقى في جسمك لعدة أيام بعد تناوله، فقد يكون بعض الدواء موجوداً ويظهر في البول أو البراز أو العرق أو القيء.

للحفاظ على نفسك وأهلك وإبقاء البيئة آمنة قدر الإمكان
اتبع التعليمات أدناه كل يوم طول فترة استخدام العلاج:

- يمكنك استخدام نفس المرحاض التي تستخدمها عادةً.
- في حالة اتساخ المرحاض أو مقعد المرحاض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمرحاض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض.
- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مرحاض طبي (**bedpan**)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتناس فضلات الجسم.

- اغسل أي جلد تعرض لفضلات الجسم أو الدواء بالماء والصابون.
- يجب غسل البياضات (المفارش) أو الملابس المتسخة بسوائل الجسم أو فضلات الجسم بشكل منفصل عن البياضات والملابس الأخرى.
- إذا لم يكن لديك غسالة، ضع البياضات المتسخة في كيس بلاستيكي حتى يمكن غسلها.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس البياضات أو الملابس التي قد تكون ملوثة بسوائل الجسم.



يجب على المرأة الحامل تجنب لمس
أي شيء قد يكون ملوثًا بسوائل
الجسم من المريض.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدلية الداخلية



King-fahad-medical-city



@kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.21.0001175

