



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



دواء ايتوبوسايد

Etoposide 10mg/ml

طرق تخزين الدواء:



التخزين	يحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة.
مدة صلاحية الدواء	٢٢ يومًا من تاريخ فتح العلبة.

⚠ احفظ الدواء بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس وبعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

خطوات تناول الدواء



كلما كان ذلك ممكنًا، يجب أن تعطي الدواء لنفسك وتابع الخطوات أدناه.

⚠ إذا احتاج أحد أفراد العائلة أو مقدم رعاية إلى إعطاء الدواء لك، فعليهم أيضًا اتباع هذه الخطوات.

١. اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة (٤٠ ثانية)
قبل وبعد لمس زجاجة الدواء.

٢. احرص على لبس القفازات المزدوجة، لتجنب مخاطر
الدواء (لا تستخدم نفس القفازات مرة أخرى تحت أي
ظرف كان).

٣. رجّ العلبة جيداً لمدة (٣٠ ثانية) في كل مرة قبل
الاستخدام.

٤. قم بقياس الجرعات السائلة بعناية، استخدم جهاز
القياس الذي يأتي مع هذا الدواء.

٥. يتم إعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

٦. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

٧. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في
(كيس بلاستيكي) ثم احكم إغلاقه وتخلص منه
فوراً.

٨. اغسل يديك بالماء والصابون.

انتبه!



إذا نسيت جرعة، تناول الجرعة الفائتة بمجرد أن تفكر في ذلك. ⚠️

إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتجاوز الجرعة الفائتة وعد إلى وقتك الطبيعي.

لا تأخذ جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية. ⚠️

طرق التخلص من الدواء:



إذا كان لديك أي **ايتوبوسايد** غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المراحيض، يرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول:



- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين شطفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.
- إذا انسكب المشروب من الزجاجاة امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعاً بمياه نظيفة.

ما هي بعض الأشياء التي يجب أن أعرفها
أو أفعلها أثناء تناول هذا الدواء؟



- تناول هذا الدواء في نفس الوقت من اليوم قدر المستطاع.
- نظراً لأن الدواء يبقى في جسمك لعدة أيام بعد تناوله، فقد يكون بعض الدواء موجوداً في البول أو البراز أو العرق أو القيء.

بمجرد أن تبدأ في تناول الدواء، من المهم
اتباع التعليمات أدناه كل يوم طالما استمر
العلاج. وذلك للحفاظ على نفسك وأهلك
والبيئة آمنة قدر الإمكان.

التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات



- اغسل أي جلد تعرض لفضلات الجسم أو الدواء بالماء والصابون.
- يجب غسل البياضات أو الملابس المتسخة بسوائل الجسم أو فضلات الجسم بشكل منفصل عن البياضات الأخرى وملابس.
- إذا لم يكن لديك غسالة، ضع البياضات المتسخة في كيس بلاستيكي حتى يمكن غسلها.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس البياضات أو الملابس التي قد تكون ملوثة بسوائل الجسم.

- قد يؤثر هذا الدواء على الخصوبة، بالتالي قد تؤدي مشاكل الخصوبة إلى عدم القدرة على الحمل.

- قد يسبب هذا الدواء ضرراً للجنين إذا تم تناوله أثناء الحمل.

- إذا كنت حاملاً أو حملت أثناء تناول هذا الدواء، فاتصل بطبيبك على الفور. وأخبري طبيبك إذا كنت مرضعة.

- يجب على المرأة الحامل تجنب لمس

أي شيء قد يكون ملوثاً بسوائل الجسم من المريض.



دورات المياه وأنظمة الصرف الصحي:

- يمكنك استخدام نفس المراض التي تستخدمها عادةً.
- في حالة اتساخ المراض أو مقعد المراض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمراض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المراض.
- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مراض طبي (bedpan)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتصاص فضلات الجسم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدليات الداخلية

HEM4.21.0001176

