




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



دواء إماتنib

Imatinib 40mg/ml

طرق تخزين الدواء



يحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة . ٢٥-٣٠ درجة مئوية	مكان التخزين
٤٠ يوماً من تاريخ تحضير الدواء.	مدة صلاحية الدواء

⚠ احفظ الدواء بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

تعامل مع الدواء بحذر، تماماً كما هو الحال عند إعطاء العلاج الكيميائي في الوريد، يمكن أن يكون هذا الدواء ساماً، ويجب الحد من تعرضه للآخرين.
اترك الدواء في العبوة المرفقة حتى يصبح جاهزاً لتناوله.

قبل تناول الدواء اتبع التعليمات التالية



كلما كان ذلك ممكناً، يجب أن تعطي **الإماتنِب** لنفسك
وابتَّدِعُ الخطوات أدناه.

- لكن إذا احتاج أحد أفراد العائلة أو صديق أو مقدم رعاية إلى
إعطاء **الإماتنِب** لك، فعليهم أيضاً اتباع هذه الخطوات.
- أثْنَاءِ اعْطَاءِ الدُّوَاءِ لِلْمَرْيِضِ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ احْتِمَالُ أَنْ
تَتَنَاثِرَ الْمَادَّةُ أَوْ إِذَا كَانَ الْمَرْيِضُ قَدْ يَقاوِمُ، قَمْ بِارْتِدَاعِ
واقيِ (العين/الوجه).

خطوات تناول الدواء:

١. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة (**٤ ثانية**) كحد
أدنى.
٢. ارتدي القفازات لتجنب لمس الدواء.
٣. رجّ العلبة جيداً في كل مرة قبل الاستخدام.

٤. قم بسحب الجرعة المناسبة بالتحديد إذا كان الشكل الدوائي في علبة باستخدام (الحقنة الفموية) المدرجة بقياسات مل
- ⊗ لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة واحدة.
 - ٥. يتم اعطاء الدواء فورا عن طريق الفم مع الماء.
 - ٦. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.
 - ٧. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميهما في كيس بلاستيكى ثم ادكهم إغلاقه وتخلص منه فورا.
 - ٨. اغسل يديك بالماء والصابون.

طرق التخلص من الدواء



إذا كان لديك أي **ماتنبع** غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المرحاض، فيرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول



- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين، اشطّفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة 15 دقيقة على الأقل.
- إذا انسكب المشروب من الزجاجة امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها وتخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبعاً بمياه نظيفة.

التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات



- نظراً لأن إماتنِب يبقى في جسمك لعدة أيام بعد تناوله، فقد يكون بعض الدواء موجوداً في البول أو البراز أو العرق أو القيء .
- بمجرد أن تبدأ في تناول الدواء، من المهم اتباع التعليمات أدناه كل يوم طالما استمر العلاج للحفاظ على نفسك واهلك، ولبيئة آمنة قدر الإمكان.
- ا. يجب على المرأة الحامل تجنب لمس أي شيء قد يكون ملوثاً بسوائل الجسم من المريض .
- ـ.ـ دورات المياه وأنظمة الصرف الصحي:
- يمكنك استخدام نفس المرحاض التي تستخدمنها عادةً.

- في حالة اتساخ المرحاض أو مقعد المرحاض بالبول أو البراز أو القيء، قم بتنظيف الأسطح قبل استخدام الآخرين.
 - اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض.
 - إذا كنت بحاجة إلى مقعد مرحاض طبي (bedpan)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي القفازات للمساعدة في تنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
 - إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهور بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتصاص فضلات الجسم.
٣. اغسل أي جلد تعرض لفضلات الجسم أو الدواء بالماء والصابون.

٤. يجب غسل البياضات أو الملابس المتسخة بسوائل أو فضلات الجسم بشكل منفصل عن البياضات والملابس الأخرى .

- إذا لم يكن لديك غسالة، ضع البياضات المتسخة في كيس بلاستيكي حتى يمكن غسلها .
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس البياضات أو الملابس التي قد تكون ملوثة بسوائل الجسم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلة الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh



Kfmcriyadh



8001277000

HEM4.21.0001178

