



دواء ميركابتوبيورين
(Mercaptopurine 20mg/ml)

طرق تخزين الدواء:



يحفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة.	مكان التخزين
٦٥ يوماً من تاريخ فتح العلبة.	مدة صلاحية الدواء

⚠ احفظ الدواء بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

خطوات تناول الدواء:



قبل تناول الدواء اتبع التعليمات التالية:

١. اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة (٤٠ ثانية) قبل وبعد لمس زجاجة الدواء.

٢. احرص على لبس القفازات المزدوجة، لتجنب مخاطر الدواء (لا تستخدم نفس القفازات مرة أخرى تحت أي ظرف كان).

٣. رجّ العلبة جيداً لمدة (٣٠ ثانية) في كل مرة قبل الاستخدام.

٤. قم بقياس الجرعات السائلة بعناية، استخدم جهاز القياس الذي يأتي مع هذا الدواء.

٥. يتم إعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

٦. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

٧. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في (كيس بلاستيكي) ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.

٨. قم بتنظيف جهاز القياس بالماء والصابون.

٩. اغسل يديك بالماء والصابون.

طرق التخلص من الدواء:



إذا كان لديك أي ميركابتوبيورين غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المراض، فيرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول:



- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين شطفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.
- إذا انسكب المشروب من الزجاجات امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق

الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعاً
بمياه نظيفة.

**ما هي بعض الأشياء التي يجب أن أعرفها أو
أفعلها أثناء تناول هذا الدواء؟**



- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية أنك تتناول هذا الدواء، وهذا يشمل الأطباء والممرضات والصيدلة وأطباء الأسنان.
- قد يؤثر الدواء في الدم ونخاع العظام مثل فقر الدم، أو انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء. قد تكون هناك حاجة لتغيير الجرعة أو حتى إيقاف الدواء في حال حدوث هذه الآثار الجانبية. تحدث مع الطبيب فوراً.
- قد يكون لديك فرصة أكبر للإصابة بعدوى، اغسل يديك دائماً وابتعد عن الأشخاص المصابين بالعدوى أو نزلات البرد.

- قد يؤدي استخدام اللقاحات مع هذا الدواء إلى زيادة فرصة الإصابة بالعدوى. تحدث مع طبيبك قبل الحصول على أي لقاح.
- قد تنزف بسهولة أكبر، كن حذرا وحاول تجنب الإصابة قدر الإمكان، استخدم فرشاة أسنان ناعمة وماكينة حلاقة كهربائية.
- تحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من نقص (TPMT) أو (NUDT15).
- نوع نادر من السرطان يسمى سرطان الغدد الليمفاوية التائية الكبدية الطحالية (HSTCL) قد يحدث مع هذا الدواء، أخبر طبيبك إذا كان لديك أي نوع من أنواع السرطان.
- قد تصاب بحروق الشمس بسهولة أكبر. استخدم واقٍ من الشمس وارتدِ الملابس التي تحميك من الشمس.

- قد يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم، وخاصة عند الأطفال. قد تكون العلامات الدوخة، والصداع، والشعور بالنعاس. اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي من هذه العلامات.
- قد يؤثر هذا الدواء على الخصوبة. قد تؤدي مشاكل الخصوبة إلى عدم القدرة على الحمل.
- قد يسبب هذا الدواء ضرراً للجنين أو فقدان الجنين. سيتم إجراء اختبار الحمل قبل البدء في تناول هذا الدواء.
- يجب على النساء استخدام وسائل منع الحمل أثناء تناول هذا الدواء ولبعض الوقت بعد آخر جرعة. إذا حملت، اتصلي بطبيبك.



❖ دورات المياه وأنظمة الصرف الصحي:

✓ يمكنك استخدام نفس المراض التي تستخدمها عادةً.

✓ في حالة اتساخ المراض أو مقعد المراض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمراض.

✓ اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المراض.

✓ إذا كنت بحاجة إلى مقعد مراض طبي (bedpan)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.

✓ إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتناس فضلات الجسم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدليات الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.21.0001179

