



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



دواء مايكوفينوليت

Mycophenolate
200mg/ml

طرق تخزين الدواء



التخزين	احفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة
مدة صلاحية الدواء	تظل صلاحية الدواء لمدة شهرين من تاريخ الصنع

⚠ احفظ الدواء بعيداً عن الضوء والرطوبة وأشعة الشمس، وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

خطوات تناول الدواء



قبل التعامل مع الدواء عليك بمعرفة الآتي:

- قم بتناول الدواء على معدة فارغة، إلا إذا قال طبيبك غير ذلك.
- لا تخط في تناول الدواء مع أدوية أخرى، أفصل بينها بساعتين على الأقل.
- استمر في تناول هذا الدواء كما أخبرك طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية، حتى لو كنت تشعر بتحسن.

قبل تناول الدواء اتبع التعليمات التالية:

1. اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة (٤٠ ثانية) قبل وبعد لمس زجاجة الدواء.

2. احرص على لبس القفازات المزدوجة، لتجنب مخاطر الدواء (لا تستخدم نفس القفازات مرة أخرى تحت أي ظرف كان).

3. رجّ العلبة جيداً لمدة (٦ ثانية) في كل مرة قبل الاستخدام.

4. قم بقياس الجرعات السائلة بعناية، استخدم جهاز القياس الذي يأتي مع هذا الدواء.

5. يتم إعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

6. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

7. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في (كيس بلاستيكي) ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.

8. قم بتنظيف جهاز القياس بالماء والصابون.

9. اغسل يديك بالماء والصابون.

طرق التخلص من الدواء



⚠ إذا كان لديك أي مايكوفينوليت غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المراض، يرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول



- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين شطّفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة ١٥ دقيقة على الأقل.
- إذا انسكب المشروب من الزجاجاة امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها وتخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعاً بمياه نظيفة.

ما هي بعض الأشياء التي يجب أن أعرفها أو أفعلها أثناء تناول هذا الدواء؟



- يجب أن يحرص مقدم الرعاية على بارتداء **قفازات** وارتداء (**واقٍ للعين/الوجه**) إذا كان المريض يواجه صعوبة في ابتلاع المستحضر أو إذا كان قد يقاوم أو يتقيأ أو يبصق الدواء.
- تجنب الحمل أثناء العلاج ولمدة **٦ أسابيع** بعد آخر جرعة. يجب على المرأة الحامل تجنب لمس الدواء.
- يجب تجنب التبرع بالدم أو مشتقاته خلال ولمدة **٦ أسابيع** على الأقل بعد آخر جرعة.
- ينصح بتجنب اللقاحات أثناء العلاج ما لم يوافق عليه أخصائي الرعاية الصحية.
- قد تشمل الآثار الجانبية الإسهال والقيء والإمساك والغثيان.

- ينصح باستخدام واقي من الشمس وارتداء ملابس واقية وتجنب أجهزة التسمير بسبب احتمالية الحساسية للضوء.
- ينصح بالإبلاغ عن أعراض العدوى أو اعتلال الدم.
- ينصح المريض بتجنب الاستنشاق أو التلامس المباشر مع الجلد أو الأغشية المخاطية مع المشروب الموجود في العلبة.
- تحذير عن تناول مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم أو الألومنيوم مع الدواء أو ساعتين بعد الدواء.

دورات المياه وأنظمة الصرف الصحي:

- يمكنك استخدام نفس المراض التي تستخدمها عادةً.
- في حالة اتساخ المراض أو مقعد المراض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين لها.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المراض.
- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مراض طبي (**bedpan**)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتصاص فضلات الجسم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدلة الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.21.0001181

