مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City

دواء تاكروليماس

Tacrolimus 1mg/ml

طرق تخزين الدواء

التخزين	احفظ الدواء في درجة حرارة الغرفة
مدة صلاحية الدواء	تظل صلاحية الدواء لمدة ٤ أشهر من تاريخ الصنع

⚠ احفظ الدواء بعيداً عن الضوء والرطوبة وأشعة الشمس، و بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

خطوات تناول الدواء

قبل تناول الدواء اتبع التعليمات التالية:

1. اغسل يديك بالماء والصابون بعناية لمدة (٤٠ ثانية) قبل وبعد لمس زجاجة الدواء.
2. احرص على لبس القفازات المزدوجة، لتجنب مخاطر الدواء (لا تستخدم نفس القفازات مرة أخرى تحت اي ظرف كان).
3. رجّ العلبة جيداً لمدة (٣٠ ثانية) في كل مرة قبل الاستخدام.
4. قم بسحب الجرعة المناسبة بالتحديد إذا كان الشكل الدوائي في علبة باستخدام (الحقنة الفموية) المدرّجة بقياسات مل، لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة واحدة.

5. يتم اعطاء الدواء فورا عن طريق الفم مع الماء .
6. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر .
7. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في (كيس بلاستيكي) ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فورًا.
8. اغسل يديك بالماء والصابون.

- إذا نسيت جرعة، تناول الجرعة الفائتة بمجرد أن تفكر في ذلك.
- إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتجاوز الجرعة الفائتة وعد إلى وقتك الطبيعي.
- لا تأخذ جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

طرق التخلص من الدواء

كان لديك أي تاكروليماس غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المرحاض، يرجى إعادته إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.



كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول

- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين شطّفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة ١٥ دقيقة على الاقل.

- إذا انسكب المشروب من الزجاجة امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها وتخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعًا بمياه نظيفة.

التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات

- استمر في تناول هذا الدواء كما أخبرك طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية، حتى لو كنت تشعر بتحسن.
- لمقدم الرعاية، يجب ان يقوم بالوقاية بارتداء قفازات وارتداء (واقٍ للعين/الوجه) إذا كان المريض يواجه صعوبة في ابتلاع المستحضر أو إذا كان قد يقاوم أو يتقيأ أو يبصق الدواء.

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية أنك تتناول هذا الدواء، وهذا يشمل الأطباء والممرضات والصيادلة وأطباء الأسنان.
- قد يكون لديك فرصة أكبر للإصابة بعدوى، اغسل يديك، وابتعد عن الأشخاص المصابين بالعدوى أو نزلات البرد.
- تؤثر العديد من الأدوية الأخرى على مقدار هذا الدواء في جسمك، إذا كنت تتناول أدوية أخرى، فاستشر طبيبك.
- قد يحدث ارتفاع في ضغط الدم ونسبة السكر في الدم مع هذا الدواء، افحص ضغط دمك ونسبة السكر كما أخبرك طبيبك.
- إذا لم تكن على اطلاع دائم بجميع لقاحاتك، تحدث مع طبيبك. قد تحتاج إلى بعض اللقاحات قبل العلاج بهذا الدواء.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس وأسرة التسمير، استخدم واقٍ من الشمس وارتدِ الملابس التي تحميك من أشعة الشمس.

- يجب على المرأة الحامل تجنب لمس أي شيء قد يكون متعلق بالدواء.
- قد يؤثر هذا الدواء على الخصوبة، قد تؤدي مشاكل الخصوبة إلى عدم القدرة على الحمل.
- إذا كنت حاملاً أو حملت أثناء تناول هذا الدواء، فاتصل بطبيبك على الفور. وأخبري طبيبك إذا كنت مرضعة.

دورات المياه وأنظمة الصرف الصحي:

- يمكنك استخدام نفس المرحاض التي تستخدمها عادةً.
- في حالة اتساخ المرحاض أو مقعد المرحاض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمرحاض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض.
- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مرحاض طبي (**bedpan**)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات

للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.

- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاضات أو شرشف لامتصاص فضلات الجسم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلة الداخلية

King-fahad-medical-city

@Kfmc_Riyadh

KfmcRiyadh

8001277000

HEM4.21.0001184