



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



دواء ثايوقوانين

Thioguanine 20mg/ml

طرق تخزين الدواء:



مكان التخزين	في الثلاجة ما بين ٢-٨ درجة مئوية
مدة صلاحية الدواء	٨٤ يوما من تاريخ تحضيره

⚠ احفظ الدواء بعيداً عن الرطوبة وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

خطوات تناول الدواء:



⚠ تعامل مع الدواء بحذر، تماماً كما هو الحال عند إعطاء العلاج الكيميائي في الوريد، يمكن أن يكون هذا الدواء ساماً، ويجب الحد من تعرضه للآخرين. ⚠ اترك الدواء في العبوة المرفقة حتى يصبح جاهزاً لتناوله.

يجب أن تعطي **ثايقوانين** لنفسك واتبع الخطوات
أدناه:

⚠ في حال احتجت للمساعدة لتقديم الدواء من أحد
أفراد العائلة أو صديق أو مقدم رعاية فعليةهم أيضاً
اتبع هذه الخطوات.

١. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة (٤٠ ثانية) كحد أدنى.
٢. ارتدِ القفازات لتجنب لمس الدواء.



⚠ إذا كان هناك احتمال أن تتناثر المادة أو
إذا كان المريض قد يقاوم، فقم بارتداء
واقٍ (العين/الوجه).

٣. رجّ العلبة جيداً في كل مرة قبل الاستخدام.
٤. قم بسحب الجرعة المناسبة بالتحديد إذا كان الشكل
الدوائي في علبة باستخدام (الحقنة الفموية) المدرّجة
بقياسات مل،

❌ لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة واحدة.

٥. يتم اعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

٦. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

⚠️ تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في كيس

بلاستيكي ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.



٧. اغسل يديك بالماء والصابون.

طرق التخلص من الدواء:



إذا كان لديك أي **ثايوقوانين** غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المراحيض، فيرجى إعادتها إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول:



- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم **فوراً** بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.

- عند ملامستها العين شطفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة ٥ دقائق على الأقل.
- إذا انسكب المشروب من الزجاجاة امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها وتخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعاً بمياه نظيفة.

التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات:



- نظراً لأن **ثايوقوانين** يبقى في جسمك لعدة أيام بعد تناوله، فقد يكون بعض الدواء موجوداً ويظهر في البول أو البراز أو العرق أو القيء.

للمحافظة على نفسك وأهلك وإبقاء البيئة آمنة قدر الإمكان
اتبع التعليمات أدناه كل يوم طول فترة استخدام العلاج:

- يمكنك استخدام نفس المراض التي تستخدمها عادةً.
- في حالة اتساخ المراض أو مقعد المراض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمراض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المراض.
- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مراض طبي (**bedpan**)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر بلاستيكي أو حفاضات أو ششف لامتصاص فضلات الجسم.

- اغسل أي جلد تعرض لفضلات الجسم أو الدواء بالماء والصابون.
- يجب غسل البياضات (المفارش) أو الملابس المتسخة بسوائل الجسم أو فضلات الجسم بشكل منفصل عن البياضات والملابس الأخرى.
- إذا لم يكن لديك غسالة، ضع البياضات المتسخة في كيس بلاستيكي حتى يمكن غسلها.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس البياضات أو الملابس التي قد تكون ملوثة بسوائل الجسم.



يجب على المرأة الحامل تجنب لمس
أي شيء قد يكون ملوثًا بسوائل
الجسم من المريض.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدليات الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM4.21.0001186

