



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



دواء فال قانسايكلوفير

ValGANciclovir 60mg/ml

طرق تخزين الدواء



التخزين	احفظ الدواء في درجة الحرارة ما بين ٢-٨ درجة مئوية
مدة صلاحية الدواء	تظل صلاحية الدواء لمدة ٣٥ يوما من تاريخ تحضير الدواء

⚠ احفظ الدواء بعيداً عن الضوء والرطوبة وأشعة الشمس، وبعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

خطوات تناول الدواء



⚠️ تعامل مع الدواء بحذر، تمامًا كما هو الحال عند إعطاء العلاج الكيميائي في الوريد، يمكن أن يكون هذا الدواء سامًا، ويجب الحد من تعرضه للآخرين. اترك الدواء في العبوة المرفقة حتى يصبح جاهزًا لتناوله.

كلما كان ذلك ممكناً، يجب أن تعطي فال قانسايكلوفير لنفسك واتبع الخطوات أدناه

⚠ إذا احتاج أحد أفراد العائلة أو صديق أو مقدم رعاية إلى إعطاء فال **قانسايكلوفير** لك، فعليهم أيضاً اتباع هذه الخطوات.

⚠ أثناء إعطاء الدواء للمريض، إذا كان هناك احتمال أن تتناثر المادة أو إذا كان المريض قد يقاوم، فقم بارتداء واقٍ **(العين/الوجه)**.

١. اغسل يديك بالماء والصابون لمدة **(٤ ثانية)** كحد أدنى.

٢. ارتدِ القفازات لتجنب لمس الدواء.

٣. رجّ العلبة جيداً في كل مرة قبل الاستخدام.

٤. قم بسحب الجرعة المناسبة بالتحديد إذا كان

الشكل الدوائي في علبة باستخدام **(الحقنة الفموية)**

المدرّجة بقياسات مل، لا تستخدم الحقنة الفموية أكثر من مرة واحدة.

٥. يتم اعطاء الدواء فوراً عن طريق الفم مع الماء.

٦. انزع القفازات ولا تستخدمها لأي شيء آخر.

٧. تخلص من القفازات بشكل صحيح برميها في كيس بلاستيكي ثم احكم إغلاقه وتخلص منه فوراً.

٨. اغسل يديك بالماء والصابون.

طرق التخلص من الدواء



إذا كان لديك أي فال **قانسايكلوفير** غير مستخدم، فلا ترميه في سلة المهملات ولا تغسله في الحوض أو المراحيض، **يرجى** إعادته إلى الصيدلية حيث تم ملء الوصفة الطبية.

كيفية التعامل مع الدواء عند انسكاب المحلول



- عند التعرض للدواء عن طريق الخطأ قم فوراً بغسل المنطقة المتضررة بالماء والصابون جيداً.
- عند ملامستها العين شطفها جيداً بالماء أو غسول العين (متساوي التوتر) المخصص لهذا الغرض لمدة **١٥ دقيقة** على الأقل.
- إذا انسكب المشروب من الزجاجاة امسحها على الفور بمنشفة رطبة يمكن التخلص منها وتخلص منها في حاوية مغلقة مثل (كيس بلاستيكي)، يجب بعد ذلك تنظيف مناطق الانسكاب ثلاث مرات باستخدام محلول منظف متبوعاً بمياه نظيفة.

التعامل مع سوائل الجسم والمخلفات



⚠️ نظراً لأن **فال قانسايكلوفير** يبقى في جسمك لعدة

أيام بعد تناوله، فقد يكون بعض الدواء موجوداً في
البول أو البراز أو العرق أو القيء.

- بمجرد أن تبدأ في تناول الدواء، من المهم اتباع التعليمات أدناه كل يوم طالما استمر العلاج. هذا للحفاظ على نفسك واهلك والبيئة آمنة قدر الإمكان.

- يجب على المرأة الحامل تجنب لمس أي شيء قد يكون ملوثاً بسوائل الجسم من المريض.

دورات المياه وأنظمة الصرف الصحي:

- يمكنك استخدام نفس المراض التي تستخدمها عادةً.
- في حالة اتساخ المراض أو مقعد المراض بالبول أو البراز أو القيء، نظف الأسطح قبل استخدام الآخرين للمراض.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد استخدام المراض.
- إذا كنت بحاجة إلى مقعد مرحاض طبي (bedpan)، فتأكد من أن مقدم الرعاية يعرف كيف يرتدي قفازات للمساعدة في التنظيف وغسل المقعد باستخدام الصابون والماء كل يوم.
- إذا لم يكن لديك تحكم جيد في المثانة أو الأمعاء، فاستخدم ضمادة يمكن التخلص منها بظهر

بلاستيكي أو حفاظات أو شرشف لامتناس فصالات
الجسم.

- اغسل أي جلد تعرض لفصالات الجسم أو الدواء
بالماء والصابون.
- يجب غسل البياضات أو الملابس المتسخة بسوائل
الجسم أو فصالات الجسم بشكل منفصل عن
البياضات الأخرى وملابس.
- إذا لم يكن لديك غسالة، ضع البياضات المتسخة في
كيس بلاستيكي حتى يمكن غسلها.
- اغسل يديك بالماء والصابون بعد لمس البياضات أو
الملابس التي قد تكون ملوثة بسوائل الجسم.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلة الداخلية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM 4.21.0001187

