



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



ليوثايرونين

Liothyronine

تحذير:

يحظر استعمال هذا العقار لعلاج السمنة أو فقدان الوزن. قد تحدث آثار جانبية بالغة السوء ومميتة أحياناً إذا تم تناول هذا العقار بجرعات كبيرة أو تم تناوله مع عقاقير أخرى لعلاج فقدان الوزن. يرجى استشارة الطبيب.

ما هي أوجه استعمال هذا الدواء؟

♦ يُستخدم هذا العقار لإمداد الجسم بهرمون

الغدة الدرقية.

♦ يُستخدم هذا العقار لعلاج تضخم الغدة الدرقية

أو للوقاية منه.

♦ يستخدم هذا العقار لاختبار مشكلات الغدة

الدرقية.

ما الذي أحتاج أن أقوله لطبيبي قبل أن أتناول هذا

العقار؟

- إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي عقاير مثل هذا العقار أو أي عقاير أخرى، أو أطعمة أو أي مواد أخرى. أخبر طبيبك عن نوع الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو الحكة أو ضيق النفس أو إحداث صوت صفير أثناء التنفس أو السعال أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو أي علامات أخرى.
- إذا كنت تعاني أياً من المشكلات الصحية التالية: زيادة في نشاط الغدة الدرقية أو قصور في نشاط الغدة الكظرية.
- أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل العقاير التي تتناولها التي صُرفت بوصفة طبية أو دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية كالأعشاب والفيتامينات ومشاكلك الصحية.

• تجنب البدء في تعاطي الجرعة من أي عقار أو

إيقافها أو تغييرها دون الرجوع إلى طبيبك.

ما هي الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها عند تناول

هذا الدواء؟

■ يراعى إبلاغ أطباء الأسنان والجراحين والأطباء الآخرين

بأنك تستعمل هذا العقار.

■ احرص على ألا ينفذ هذا الدواء من عندك.

■ إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم (مرض

السكر)، فستحتاج إلى متابعة نسبة السكر في الدم

بانتباه.

■ عليك إجراء فحوصات دموية حسب تعليمات

الطبيب. يرجى استشارة الطبيب.

■ يجب إخبار طبيبك، إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل

أو الإرضاع. لا بد من التشاور بخصوص المزايا والمخاطر

المرتبطة باستعمال هذا العقار أثناء حملك ورضاعتك.

الأعراض الجانبية والأسباب الداعية للاتصال

بأخصائي الرعاية الصحية على الفور:

♦ آلام أو ضغط في الصدر أو تسارع في ضربات

القلب.

♦ عدم انتظام ضربات القلب.

♦ الصداع.

♦ ضيق التنفس.

♦ تغير في الشهية لأسباب غير معروفة.

♦ زيادة أو نقص ملحوظ في الوزن.

♦ الإسهال أو البراز المتقلقل.

♦ قيء.

♦ الحلق أو سرعة الغضب.

♦ عصبي جداً أو سهل الإثارة.

♦ حالة عدم استقرار.

♦ انعدام القدرة على النوم.

♦ حساس للحرارة.

♦ عرق شديد.

♦ تغيرات في الدورة الشهرية. وتشمل هذه

التغيرات البقع في الفترة بين الدورتين أو دورات
شهرية خفيفة للغاية.

♦ قد يحدث تساقط للشعر لدى بعض الأشخاص في
أول بضعة أشهر من استخدام هذا العقار. الأمر
الذي عادةً ما يعود إلى طبيعته.

ما هي أفضل طريقة لتناول الدواء؟

❖ تناول هذا العقار حسب الجرعة الموصى بها من
طبيبك حتى إذا شعرت بتحسن.

❖ تناول هذا العقار في نفس الوقت من اليوم.

❖ حظر تناول الكوليستيبول أو الكوليستيرامين خلال
4 ساعات من تناول هذا العقار.

❖ قد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يظهر مفعول
الدواء.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

- ✓ تناول الجرعة الفائتة فور تذكرك.
- ✓ إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتخط الجرعة الفائتة وارجع لمواعيدك العادية.
- ✓ يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

كيف يتم تخزين هذا الدواء؟

يُخزن في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف بعيد عن الضوء. يحظر التخزين في الحمام.

إرشادات عامة:

- إذا لم تتحسن الأعراض أو المشاكل الصحية التي تعاني منها أو إذا ازدادت سوءاً، اتصل بطبيبك.
- يحظر مشاركة العقاقير التي تتناولها مع أشخاص آخرين، ويحظر كذلك تناول أي عقاقير خاصة بشخص آخر.

- إذا اعتقدت أنك تناولت جرعة زائدة، اتصل بمركز مكافحة السموم لديك أو احصل على الرعاية الطبية على الفور. كن جاهزًا لعرض أو الإخبار عن ما تتناوله وكميته ومتى حدث ذلك.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الدراسات العليا

HEM2.17.000603

