



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



تخدير الاطفال

Pediatric Anesthesia

يوفر لك هذا الكتيب معلومات عن إجراءات التخدير
لمساعدة الأهل أو مرافقي الطفل في فهم خطوات
تجربة التخدير خلال فترة بقائه بالمشفى و مساعدته
و تهيئته للعملية أو الإجراء الطبي.

إن كنت تريد المزيد من المعلومات بإمكانك
الاستفسار من أطباء التخدير المتواجدين بعيادة
التخدير وخلال زيارتكم للطبيب.

ما قبل العملية أو الإجراء الطبي

في عيادة التخدير:

سيتم استضافتكم بعيادة التخدير لتقييم حالة

الطفل الصحية. ومن الجوانب الهامة التي سيتم

مناقشتها والاستفسار عنها، إن كان هناك:

✓ تخدير سابق.

✓ مضاعفات من تخدير سابق أو تاريخ عائلي



لمضاعفات من التخدير.

✓ تطعيم حديث.

✓ وجود حساسية من

أطعمة أو أدوية أو مواد.

كما سيتم مناقشة الخطة للتخدير وأخذ الموافقة



الخطية و الإجابة على استفساراتكم.

إن خيارات التخدير المطروحة للأطفال أقل من ١٠ سنوات هي تخدير كامل مع احتمالية تخدير منطقي بحسب حالة الطفل ونوع العملية الجراحية.

ما هي زيارة ما قبل العملية أو الإجراء الطبي؟

هي زيارة مشابهة لعيادة التخدير لتقييم حالة الطفل الصحية أو إعادة تقييمها في حال زرتهم العيادة من قبل.

ما دور الأهل خلال تواجدهم بالمشفى أو

بالمنزل باليوم الذي يسبق العملية أو الإجراء

الطبي؟

• لتهدئة طفلك بالتحدث معه والجلوس بقربه إن

لاحظت توتره.

- لإشغاله بقراءة كتاب أو قص قصة عليه أو لمشاهدة التلفاز معه أو إعطائه جهاز لوجي، أو إضار لعبته المفضلة للمشفى.
- حتى يصوم الطفل عن الطعام و الشراب قبل العملية أو الإجراء الطبي بثمانى ساعات.



في يوم العملية أو الاجراء الطبي

✓ سيتم استقبال الطفل بمرافقة أهله أو المرافق

بمنطقة انتظار العمليات والتأكد من هويته عن



طريق الإسورة التعريفية.

✓ قد يتم إعطاؤه مهدئا لمحاولة تسهيل عملية

دخوله لغرفة العمليات

✓ قد يتم السماح لمرافق الطفل بدخول غرفة

العمليات بمرافقته لحين نومه بحسب حالة

الطفل وقرار طبيب التخدير.

✓ بعد دخول الطفل لغرفة العمليات يتم وضع

أجهزة مراقبة العلامات الحيوية

✓ ثم يتم تخديره إما عن طريق أدوية تعطى عن

طريق الوريد أو غازات يستنشقها عن طريق القناع



ومن ثم يتم عمل إجراء

التخدير المنطقي إن كان

جزءاً من خطة التخدير.

✓ ويتم مراقبة الطفل خلال فترة العملية وبعد

الانتهاء من العملية يتم إيقاظ



الطفل ومن ثم نقله

للإفاقة.

في منطقة الإفاقة بعد العملية

✓ يبقى الطفل بمنطقة الإفاقة لمدة ٣٠ إلى ٤٥

دقيقة

و يسمح للأهل بمرافقة الطفل فيها.

✓ يتم مراقبة العلامات الحيوية للطفل خلال فترة
بقائه.

✓ يتم إعطاؤه مسكنات للألم إن كان يشعر به مثل



الباراسيتامول أو المورفين عن
طريق الوريد أو التحاميل.

✓ في حالة وجود تخدير جزئي فإنه يساعد الطفل من

حيث تقليل شعوره بالألم وكذلك تقليل الحاجة

للمسكنات الوريدية ومضاعفاتها.

✓ لا يسمح لطفلك بالأكل أو الشرب في غرفة

الإفاقة.

✓ بعد فترة البقاء بالإفاقة يتم نقل الطفل لغرفته

أو وحدة عمليات اليوم الواحد.

قد تواجه طفلك بعض الأعراض التي يتوقع حدوثها، و

منها:

التأخر بالاستيقاظ
حسب مدة العملية
ونوع التخدير.

بكاء أو عدم شعور
بالراحة نتيجة الألم.

غثيان أو استفراغ أو
الشعور بالدوخة في
بعض الأحيان.

أسئلة شائعة



ما أضرار أو مضاعفات التخدير؟

قد تكون المضاعفات الشائعة وجود ألم بالحلق، دوخة، غثيان، استفراغ، هياج عند الاستيقاظ وهي مضاعفات بسيطة وتبقى لمدة زمنية قصيرة ثم تزول، كما أن هناك أدوية تعطى للتخفيف من هذه الأعراض أو علاج بعضها.

ماهي نسبة حدوث مضاعفات خطيرة؟

أصبح التخدير من أكثر الإجراءات الطبية أمانا و
إمكانية حدوث المضاعفات الخطيرة من التخدير
تكاد لاتذكر.

متى سيستيقظ طفلي من التخدير؟

يختلف الوقت الذي يحتاجه الطفل للاستيقاظ فبعض
الأطفال يستيقظ سريعا و بعضهم بحاجة لوقت
أطول.

كما أن هناك عوامل تؤثر على مدة استيقاظ الطفل
مثل مدة الإجراء الطبي و الأدوية المعطاة للطفل.

ماهي جرعة التخدير المناسبة لطفلي؟

تعطى أدوية التخدير لكل طفل بحسب وزنه و حسب

حالته الصحية.

ما هو تخدير خارج الجافية أسفل الظهر وماهي

الفائدة منه ومضاعفاته؟

هو إعطاء دواء مسكن في تجويف أسفل الظهر بين الفقرات العجزية والعصص يهدف إلى تسكين الألم خلال وقت العملية وبعد العملية لتقليل جرعات المسكنات الوريدية و تلافي مضاعفاتها وقد يستمر مفعولها لحوالي ٤ إلى ٦ ساعات يستيقظ خلالها الطفل وهو يشعر بالألم بشكل أقل.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم التثقيف والعمليات



HEM2.17.000126

