



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



جهاز استنشاق المسحوق الجاف (السيمبيكورت)

Symbicort Medication



قبل الاستخدام، تأكد من:

- تاريخ صلاحية الدواء
- الجرعة الموصوفة
- احتواء الجهاز على كمية كافية من الدواء
- خلو الجهاز من الشوائب أو القطع المعدنية

كيف أستخدم جهاز استنشاق المسحوق الجاف (السيمبيكورت)؟



افتح الدواء بإزالة الغطاء

حدد الجرعة الدوائية؛ و ذلك بحمله
بشكل مستقيم ثم إدارة مقبض
اليدين إلى أقصى اليمين ثم إعادته إلى
موضعه الأصلي.





أخرج كامل الهواء من صدرك عن طريق الزفير بشكل طبيعي ولا تتنفس بداخل الجهاز

ضع فتحة الدواء داخل فمك و أغلق شفتيك بإحكام ثم استنشق الدواء عن طريق الفم ثم قم بحبس نفسك لأطول مدة ممكنة



عند احتياجك لجرعة ثانية، قم بتكرار الخطوات من الخطوة الثانية

أعد غطاء الجهاز إلى مكانه عند الانتهاء من أخذ الجرعات





تمضمض بعد أخذ الدواء

تذكر!


- عدد الجرعات تظهر على الشاشة وتبدأ بالانخفاض بعد كل استخدام حتى تصل إلى الصفر، مشيرة إلى انتهاء العبوة.
- لا يمكن تذوق طعم الدواء لأن كمية الجرعة قليلة جدًا.
- باتباع الإرشادات الصحيحة ثق تمامًا بأنك سوف تأخذ الجرعة اللازمة.
- تأكد من تغطية الجهاز بعد كل استخدام ولا تعرضه لدرجات رطوبة عالية.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم التثقيف الصحي

(قسم الأمراض الصدرية)



HEM1.18.000341

