




مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



الأدوية المستخدمة في

علاج أمراض القلب

Cardiac medications

الأدوية المستخدمة لضعف عضلة القلب:

يتلخص علاج ضعف عضلة القلب في التقليل من الماء والصوديوم في الجسم ، والراحة البدنية لتجنب إجهاد القلب واستخدام الأدوية لتحسين عمل القلب عن طريق ما يلي:

- التقليل من تناول ملح الطعام.
- استخدام مدرات البول مثل (Diuretics) لمساعدة الجسم على التخلص من السوائل الزائدة.
- استخدام الأدوية الموسعة للأوعية الدموية:
 - مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين أو ما تسمى بمثبطات آس (ACEI/ARB).
 - هيدرالازين (Hydralazine)، نيترات ممتدة المفعول (Isosorbide Dinitrate)، أيفابرادين (Ivabradin).

• استخدام مركبات الدجيتاليز :

تتميز هذه المركبات وخاصة أشهرها الديجوكسين بأنها تحسن من:

- القدرة الانقباضية لعضلة القلب.
- قدرة الجسم على بذل الجهد دون الشعور بالإجهاد الشديد.
- القدرة على السيطرة على حالات عدم الانتظام القلبي مثل حالات الرجفان الأذيني وذلك يحسن الأداء الوظيفي للقلب.

يجب أخذ الجرعة بدقة ومراقبتها من الارتفاع عن 
المعدل المطلوب لما لها من أضرار خطيرة.

- استخدام مضادات مستقبلات بيتا (Beta blocker) :

وهي مجموعة دوائية مفيدة في حالات هبوط القلب الإحتقاني والناجم عن اعتلال عضلة القلب التمددي، وقد أثبتت قدرتها على الحد من عدد الوفيات الناتجة عن هذا المرض.



- مضاد الألدوستيرون (Aldactone):

يصنف هذا الدواء من أنواع مدرات البول الحافظة لعنصر البوتاسيوم، يؤدي إلى تحسين وظائف العضلة و تقليل نسبة الوفيات.



الأدوية المستخدمة للذبحة الصدرية (أمراض شرايين القلب):

اعطاء هذه الأدوية مهم حيث يقلل من احتمالية الإصابة
بالجلطات مستقبلاً وكذلك الوفيات المستقبلية.

مثبطات الصفائح الدموية:

تعتبر من العلاجات الأولية و الأساسية في علاج أمراض
الشرايين التاجية وهي:

مثبطات البليت

البلافيكس/
تيكافريلور

الأسبرين

الأدوية الخافضة
للدّهون (ستاتين)

مثبطات
الأنجيوتنسين

الأدوية المستخدمة لعلاج الارتجاج الإذيني:

مسيلات الدم المضادة للتجلطات :



الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم:

- مدرات البول.
- مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.
- مضادات (مغلقات قنوات) الكالسيوم.
- حاصرات (مثبطات) بيتا.



نصائح عامة للوقاية من أمراض القلب:

ماذا لو نسيت أخذ الجرعات؟

يجب تناولها حال تذكرها ، ولكن إذا لم تتذكرها إلا مع الجرعة التالية، فلا تأخذ جرعتين ولكن خذ الجرعة التالية فقط.

ماذا يجب عمله في حالة ظهور أي من الأعراض الجانبية نتيجة استخدام الدواء؟

- في حالة ظهور أي من الأعراض الجانبية يجب إخبار الطبيب مباشرة، ويجب الالتزام بأخذ الدواء حسب وصف الطبيب وعدم التوقف عن تناول الدواء بدون إستشارته.
- في حالة الرضاعة أو الحمل يجب إخبار الطبيب المعالج.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

(قسم الصيدلة)

HEM1.18.000579

